

und Portugal. Aehnelt der Vorigen sehr, aber Zwiebel, Blätter und Blumen sind kleiner. Schaft 2blumig, 1 F. hoch und höher. Die bartlosen Blumen erscheinen vom Ende Mai bis Juli und variiren in mehreren Farben, — die Hauptfarben sind hell- und dunkelblau, weiß, hell- und dunkelgelb, braun, purpurroth, violett und bunt, getiepert und geflammt; es giebt auch eine gefüllte Abart.

Cultur: Ganz wie bei Nr. 15, sie läßt sich auch treiben wie diese.

Ixia. Irie, Abendblume. (III. 1.)

Kleine, irisähnliche Zwiebelknollenpflanzen, welche ihre zierlichen Blumen vom Ende April bis Juli entfalten. Sie stammen alle vom Cap, die *I. coelestina* ausgenommen, welche in Carolina einheimisch ist. — Von dieser reichen Gattung nenne ich hier nur einige der schönsten Arten:

1) *I. bulbifera* L. Zwiebeltragende I. (*Sparaxis bulbifera* Ait.) Schaft 3- oder mehrblumig. Blätter linealschwertförmig; die Blattwinkel zwiebeltragend. Blumen purpurroth, gelb, roth- und weißbunt oder gelbbunt.

2) *I. coelestina* Bartr. Himmelblaue I. Schaft 1blumig. Blätter linealpfriemlich. Blumen groß, himmelblau.

3) *I. conica* Salish. Kegelförmige I. Blätter linealschwertförmig. Blumen blaßgelb, citrongelb oder blaßorangefarbig, am Grunde braun gefleckt, sehr schön, in gedrängten Trauben.

4) *I. crateroïdes* Ker. Halbkugelige I. (*I. speciosa* Andr.) Schaft 2—3blumig. Blätter lineal, grasartig. Blumen prachtvoll, groß, halbkugelig-glockig, auswendig purpurroth, blaß gestreift, inwendig carmoisin- oder rosenroth; bisweilen auch auswendig weiß, mit purpurrothem Rande.

5) *I. crispa* Thbg. Krausblättrige I. (*I. undulata* Salish.) Schaft mehrblumig. Blätter schmallineal, sehr zierlich gekräuselt. Blumen schön, blau, hellviolett, rosenroth oder weiß.

6) *I. croeata* L. Safranfarbige I. (*I. hyalina* Willd.) Schaft mehrblumig. Blätter schwertförmig. Blumen schön, groß, hochorange- oder safranfarbig, am Grunde mit schwärzlichbraunen, durchscheinenden Flecken geziert. — Blüht sehr leicht.

7) *I. maculata* L. Gefleckte I. Schaft vielblumig. Blätter linealschwertförmig. Blumen im Grunde gefleckt, weiß, gelb, gelb mit purpurrother Spitze, blaßblau, blau, purpurroth (blaß gefleckt), rosenroth, violett &c.

Eine prachtvolle Varietät dieser Art ist *I. viridiflora* Lam., mit prächtigen, sternförmig=ausgebreiteten, kupfergrünen, im Grunde sammetartig-schwarzgefleckten Blumen in schlanken Aehren; Blätter lineal, sehr schmal