

8) *I. purpurea* Lam. Purpurrothe J. Schaft mehrblumig. Blätter schwertförmig. — Blumen schön, purpurroth; Scheiden purpurroth punctirt.

9) *I. rubro-cyanea* Jacq. Rothblaue J. (*Babiana rubro-cyanea* Ker.) Schaft mehrblumig. Blätter länglichlanzettlich. Blumen schön kornblumenblau, im Grunde dunkelroth gefleckt.

10) *I. tricolor* Kurt. Dreifarbige J. (*Sparaxis tricolor* Ker.) Schaft 2-, 3- oder mehrblumig. Blätter schwertförmig. Blumen groß, 3farbig, prachtvoll, mennig- oder orangeroth, am Grunde gelb, in der Mitte braun- oder schwärzlich-purpurroth gefleckt. — Variirt mit blutroth-purpurrothen, heßbunten Blumen (*Sp. versicolor* Sweet.), — mit violett-purpurrothen Blumen (*Sp. Griffini* Sweet.), — und mit rosenroth- und weißgefärbten Blumen (*Sp. blanda* Sweet.)

Cultur: Man pflanzt im Herbst mehre Zwiebelknollen in kleine Töpfe, in leichte, sandige, mit etwas leichter Lauberde vermischte Haideerde, mit einer Unterlage von grobem Kies, und durchwintert sie bei 4—6° Wärme. In der Ruhezeit hält man sie ganz trocken, wenn sie aber austreiben, giebt man ihnen mäßige Feuchtigkeit, und stellt sie nahe an die Fenster. Uebrigens lieben sie reichliche Luft und bei großer Sonnenhitze etwas Schatten; vom Anfang Juni an können sie in ein schattiges Sandbeet eingesenkt werden. Vermehrung durch Nebenbrut und Samen.

K.

Kalmia. Kalmie. (X. 1.)

Schöne, immergrüne Ziersträucher aus Nordamerika.

1) *K. angustifolia* L. Schmalblättrige K. Stengel 2—2½ F. hoch. Blätter lanzettlich oder ovallänglich, unterseits bisweilen rostfarbig. Blumen schön, tief-rosenroth, in zahlreichen Doldentrauben. Blüthezeit: Mai bis Juli. — Man cultivirt mehre niedrige, später blühende, buntblättrige u. Varietäten, die alle sehr hübsch sind

2) *K. glauca* Ait. Graugrüne K. Stengel 1½—4 F. hoch, mit 2schneidigen Zweigen. Blätter länglich, unterseits weißgrau oder graugrün. Blumen sehr zierlich, hellrosenroth, napfförmig, in Doldentrauben. Blüthezeit: April bis Juni. — Eine Varietät hat lineale, unterseits grüne Blätter: *L. rosmarinifolia* Dum. - Cour.

3) *K. latifolia* L. Breitblättrige K. Stengel 4—7 F. hoch. Blätter ei-