

Cultur: Der Samen wird im Frühjahr ins Mistbeet gesät, und wenn die Pflanzen versetzbar geworden, werden sie ins Land in lockern, fetten Boden und in sonnige Lage verpflanzt. Macht man die Aussaat Ende Mai, cultivirt dann die Pflanzen in Töpfen, und bringt sie, wenn die Witterung kalt wird, in ein Zimmer oder Glashaus, so blühen sie bis in den Winter.

2) *R. fulgida* Ait. Glänzende R. 4. Der ästige, 1—3 F. hohe Stengel ist mit länglichlanzettlichen Blättern besetzt und trägt vom Juli bis September schöne Blumen, welche aus 10—12 feuergelben Strahl- und vielen schwarzrothen Scheibenblümchen bestehen. — Pennsylvanien, Carolina.

3) *R. grandiflora* Gmel. Großblumige R. 4. Aus Nordamerika, mit ästigem Stengel, die unteren Blätter eirund, Trippig, die oberen lanzettlich, alle nehadrig. Die prächtigen Blumen erscheinen vom August bis October und bestehen aus 2 B. langen, hängenden, gelben Strahl- und schwarzrothen Scheibenblümchen.

4) *R. hirta* L. Rauhe R. 4. Stengel 1—3 F. hoch, sehr raubhaarig, fast einfach, 1—2blumig. Blätter breiteirund- oder verkehrteirund-spatelförmig, 3—5fach-gerippt. Die schönen Blumen erscheinen vom Juli bis October, sie haben dunkelgoldgelbe Strahl- und schwarzrothe Scheibenblümchen. Ist oft nur 2jährig. — Virginien, Florida.

5) *R. laciniata* L. Schließblätterige R. 4. Aus Virginien und Canada, 6—8 F. hoch und höher, ästig, mit gefiederten Wurzelblättern (Blättchen meist klappig) und 3theiligen oder ungetheilten (länglichen und eirunden) Stengelblättern. Die großen Blumen erscheinen vom Juli bis September und bestehen aus gelben Strahl- und braunen Scheibenblümchen. — Vielleicht nur Varietät von ihr ist *R. digitata* Mill., gefingerte R. (*R. lac. β. angustifolia* Pers.), nur 6 F. hoch, die unteren Blätter gefiedert, mit halbgefiederten Blättchen, die oberen einfach-gefiedert, mit schmal-lanzettlichen Blättchen, die obersten 3spaltig; die Blumen mit 7—9 goldgelben Strahlblümchen. Blühezeit: August bis Herbst. Vaterland: Virginien und Carolina.

6) *R. purpurea* L. Purpurrothe R. (*Echinacea purpurea* DC.) 4. Aus Virginien und Carolina, 3—6 F. hoch, mit lanzett- und lanzetteiförmigen Blättern und sehr schönen, großen Blumen, welche aus vielen, bandförmigen, langen, herabhängenden, purpurrothen Strahl- und schwarzpurpurnen Scheibenblümchen bestehen. Blühezeit: Juli bis September.

7) *R. serotina* Bot. Cab. Spätblühende R. (*R. speciosa* Lk. *R. purp. speciosa* Hort. *Echinacea serotina* DC.) 4. Prachtvolle Perennie aus Loui-