

tum bidui, scilicet 1. gra. $58^{\frac{1}{2}}$, $162^{\frac{1}{2}}$, $223^{\frac{1}{2}}$, $444^{\frac{1}{2}}$ $325^{\frac{1}{2}}$, $226^{\frac{1}{2}}$, $267^{\frac{1}{2}}$, collocandum è regione binarij. Huic iterum adiunge motum diurnum, & habebis motum tridui collocandum iuxta ternarium sinistrum. Huic rursum adiuncto motum diurnum, & conflabis motum quatridui, & sic consequenter ne in re plenissima sim verbosior, vt.

DIES	S	gr.	I	II	III	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	0	0	59	8	11	22	16	11	15		
2	0	1	58	16	22	44	32	22	29		
3	0	2	57	24	34	6	48	33	44		
4	0	3	56	32	45	29	4	44	59		
5	0	4	55	40	56	51	20	56	13		
6	0	5	54	49	8	15	37	7	28		
7					8c.						
8											
9											
10											

Varijs δοκιμασία vel
examen

Ac quia Canones mediorum motuum, oportet esse quam emendatissimos, proderit etiam hanc δοκιμασίαν seu collationem instituere, quam ex hoc exemplo facile transferet peritus lector ad alia. Si addis motum diurnum ad motum quinq; dierum non dubium est, quin emergat motus 6. dierum, qui tum ex duplo motus tridui, tum ex coagmentatione motus bidui & quatridui existere debet, quemadmodum notum est.

Similiter propagabis æqualem motum in alijs temporum speciebus, vt annis, mensibus, horis, nisi quod in annis Julianis rationem bisexti habere oportet, deinde & menses sunt inæquales, quia constant aut 28. aut 29. aut 30. aut 31. diebus, quod accurate in hoc negocio obseruari conuenit.

ἀφαιρεσθε.

S V B T R A C T I O,

Vt dictum est in præcedente parte, prima cura debet esse iustæ collocationis, & conuenientius superiori loco scribuntur numeri, vnde debet fieri subtractio, inferiori autem loco ij numeri, qui ab alijs auferendi sunt. Inde similia auferantur à similibus facto initio à tenuissimis seu minimis scrupulis, vt à dextris versus sinistram regrediaris, sicut in additione. Quod si acciderit, vt in aliqua specie inferior numerus à superiori subduci non queat, memineris quod sicut in additione redundantē sexagenario sub