

zwischen den Schuppen stets schwarz. — Schuppenreihen 15; Bauchschilder 160—179 (nach Schlegel bis 188): Subcaudalschilder in 71—79 Paaren <sup>1)</sup>).

Zwei Exemplare aus Neu-Holland, durch Herrn Zelebor.

### Gatt. HOPLOCEPHALUS CUV.

(*Alecto* Dum. Bibr., Jan.)

#### 1. Art HOPLOCEPHALUS CURTUS spec. Schlegel.

*Syn.* *Naja curta* Schlegel, *Phys. Serp. t. II, p. 486; Abbild. n. Amph. p. 140, tab. 48, fig. 19—20.* — *Alecto curta* Dum. Bibr., *Erpét. gén. t. VII. p. 1252; Jan, El. sist. Ofidi p. 116.* — *Hoplocephalus curtus* Günther, *Cat. Colubr. Snak. p. 216.* — *Hoplocephalus Cuvieri* Fitz., *Syst. Rept. (nec Ausb.) p. 28.*

Ein Exemplar mit siebzehn Schuppenreihen und zahlreichen, schwärzlichen Querbänden am Rumpfe; ein zweites altes Individuum mit neunzehn Schuppenreihen und einfarbigem Rücken (in der älteren Sammlung des Wiener Museums). — Von Neu-Holland.

#### 2. Art HOPLOCEPHALUS SIGNATUS spec. Jan.

*Syn.* *Alecto signata* Jan, *Prod. Icon. desc. Ophid. et desc. des nouv. espec. Serp. venim. (1859) p. 21, pl. C, fig. 4; El. sist. Ofid. p. 117.* — *Hemiaspis signata* Fitz. *Ausb. p. 410.*

Ein Exemplar von Neu-Holland.

#### 3. Art HOPLOCEPHALUS CORONOIDES Günther.

(*Catal. of Colubr. Snakes B. Mus. p. 215.*)

*Syn.* *Hoplocephalus coronatus* Fitz. (*excl. Syn.*), *Ausb. p. 410.*

Ein Exemplar von Neu-Holland.

#### 4. Art HOPLOCEPHALUS LABIALIS spec. Jan.

*Syn.* *Alecto labialis* Jan, *Prod. Icon. desc. Ophid. etc. (1859) p. 21, pl. C, fig. 3; El. sist. Ofid. p. 117; Hoplocephalus labialis* Fitz. *Ausb. p. 410.*

Ein sehr grosses Exemplar von Neu-Holland, durch v. Frauenfeld.

#### 5. Art HOPLOCEPHALUS MACULATUS n. spec.

*Char.* Kopf stark deprimirt, Verticalschild  $1\frac{1}{2}$ mal so lang wie breit, sechs Oberlippenschilder, von denen das dritte und vierte den unteren Augenrand bildet, ein Präoculare, zwei Postocularschilder; Temporal Schilder 2+2; 17 Längs-

<sup>1)</sup> Dr. Günther führt im 12. Bande der „Annals and Magaz. of Nat. Hist., third Series 1853, auf Seite 240 die Synonyma von *Diemennia superciliosa* an und bezieht auch *Pseudoelaps Sordelli* und *Kubingii* Jan zu *D. superciliosa*; ich erlaube mir gegen diese Annahme zu bemerken, dass Professor Jan in der Beschreibung von *P. Kubingii* das Vorkommen eines einfachen Nasale ausdrücklich hervorhebt, während doch Dr. Günther den Arten des Geschlechtes *Diemansia* Gray (später von ersterem Herpetologen in *Diemennia* abgeändert) zwei Nasalschilder zuweist (s. Günther's *Catal. Colubr. Snak. p. 212, zweite Zeile*). *Pseudoelaps Kubingii* Jan kann daher consequenter Weise nur in das Geschlecht *Cacophis* (Günther), dessen Charakteristik im 12. Bande der *Ann. et Magaz. N. H. p. 361* lautet: „This genus differs from *Diemennia* in having a single nasal shield“, oder aber zur *Furina* gestellt werden; letzteres dürfte am richtigsten sein.