

## Maasse eines Männchens im Balg:

Länge von der Schnauzenspitze bis zur Schenkelflughaut ungefähr . . . . .	275 Millim.
Länge des Kopfes ungefähr . . . . .	80 "
" " Ohres . . . . .	25 "
Breite " " . . . . .	14 "
Von der Schnauzenspitze bis zum Auge . . . . .	30 "
Vom Auge bis zum Ohr . . . . .	27 "
Länge des Vorderarms . . . . .	155 "
" " 1. F. Mh. 15; 1. Gl. 40; 2. Gl. 20 (in gerader Linie mit dem Nagel) .	75 "
" " 2. " " 85; " " 22; " " 13 . . . . .	120 "
" " 3. " " 110; " " 81; " " 126 . . . . .	317 "
" " 4. " " 105; " " 66; " " 70 . . . . .	241 "
" " 5. " " 115; " " 50; " " 51 . . . . .	216 "
" " Unterschenkels . . . . .	70 "
" " Sporns . . . . .	16 "
Schenkelflughaut in der Mitte . . . . .	2 "
Schwanzartiger Knorpel an der Unterseite der Schenkelflughaut . . . . .	1 "
Länge des Schädels . . . . .	75 "
" " " bis zum Foramen magnum . . . . .	68 "
Länge des knöchernen Gaumens . . . . .	42 "
Breite des Schädels über den Ohrenöffnungen . . . . .	23 "
Abstand der Jochbögen . . . . .	35 "
Länge des Unterkiefers am Processus coronoideus . . . . .	29 "

Ein junges Männchen ist im Februar 1858 im dichten Urwalde auf der Insel Car-Nicobar von Herrn Baron F. Pöck geschossen worden. Dieses Männchen ist im Balg und ein junges Männchen von demselben Fundort in Weingeist aufgestellt.

## PTEROPUS JUBATUS Esch.

Eschscholz, zool. Atlas IV. p. 1. T. 16. — Fitz., Die Ausb. der österr. Naturf. a. a. O. S. 389.

Den 21. Juni 1858 wurden zwei alte Männchen und ein altes Weibchen im Walde nächst Los Baños von Herrn Baron v. Wüllerstorff und Herrn G. v. Frauenfeld erlegt.

Fundort: Manila. Die beiden Männchen sind im Balg und das Weibchen in Weingeist aufbewahrt.

## CYNONYCTERIS PETERS.

## CYNONYCTERIS (PTEROPUS) LESCHENAULTI Desm.

Desmarest, Mammal. p. 110. — *Xantharpyia Leschenaulti* Gray. — Fitz., Die Ausb. der österr. Naturf. a. a. O. S. 389.

Fundort: Ceylon. Durch Herrn G. v. Frauenfeld ein Exemplar (W.).