

tibus nonnunquam innatat; tumque caules habet materia quadam spongiosa rectos.

Nascitur prope Veram Crucem.

MIMOSA fruticosa, spinosa; filiis latis, hirsutis et articulis. *Tab. 24.*
latis (a).

Æschynomene spinosa IV, sive foliolis Acaciæ angustioribus, frondibus validissimas spinas habentibus. *Breyn. cent. 43.*

Multiplici plerumque affurgit *caulis*, ad quinque vel sex pedum altitudinem pro ratione fecunditatis foli. *Caules* ramique lignosi sunt, et validissimis armantur spinis, incerto ordine dispositis, albicantibus, recurvis, ad basin crassis, et Rosarum spinis similibus. *Sureuli* recentiores similibus horrent spinis, et insuper albicantibus vestiuntur pilis; ut et foliorum nervi. *Folia* autem in hac planta præcipue observatione digna sunt, namque ex nervo principi, secundariorum nervorum intervallis, oriuntur sibi oppositæ geminæ spinæ, supra descriptis satis similes, sed minores et neutram recurvæ, angulos rectos cum nervo formantes, et in eodem plano cum secundariis nervis consistentes. E superiori vero nervi parte, ab eadem origine qua nervi secundarii, oritur spina singularis, teres, præcedentibus gracilior, nervo non perpendicularis, sed ei fere incumbens, mucrone versus extremum ejus protenso. *Pinnulæ* foliorum minimæ sunt (in hoc genere) et confertissimæ, in mucronem abeentes, supra virides, infra canescentes. *Flores* rubri sunt, in globulos compacti, formæque (in hoc genere) solitæ. *Fructus* vero est filixa compressa, et hirsuta; ita articulata, ut singulæ articulationes singulis seminibus foetæ, per matritatem excidant, manente vero marginali qui eas continuerat.

Nascitur copiose circa Veram Crucem solo pingui et humido.

MIMOSA herbacea, procumbens et spinosa; caule quadrangulo, *Tab. 25.*
filiis quadrivalvibus (b).

(a) *Mimosa asperata Linn.*

(b) *Mimosa quadrivalvis Linn.*

F. radice