

- \* *A. dilatatus* Duf. Suram im Mai; Ach-Bulach im Juni.  
 \* *A. annulicornis* Fabr. Trauskaukasien. (Coll. Puton.)  
 \* *A. lugubris* Fall. Suram im Mai.  
 \* *A. Betulae* L. Mit der vorigen Art zugleich; auch als Larve, häufig.  
 \* *Miris calcaratus* Fall. Mamudly.  
*Lygus pratensis* Fabr. Helenendorf im Juli.  
*Orthops Kalmii* L. Taparowan-See Anfangs Juni.  
*Charagochilus Gyllenhalii* Fall. Am Waldrande bei Hatschekent gegen Ende October.

- \* *Pilophorus clavatus* L. Helenendorf im Juli.  
*Salda saltatoria* L. Elisabeththal Anfangs November.  
*Nabis lativentris* Boh. Suram im Mai; Helenendorf im Juli; Mamudly gegen Mitte October.

- \* *Harpactor rubrogularis* n. sp. Oblongo-ovatus, niger, nitidus, remote griseo-hirsutulus; macula parva capitis inter ocellos posita pallida flavescens; gula, sulco prosternali, coxis anticis totis, macula parva apicali externa coxarum intermediarum annulisque duobus latis femorum omnium rubris; tibiis, basi apiceque exceptis, fusco-piceis, tibiis posticis praetera basin versus annulo latissimo rubro ornatis; macula discoidali numerum 8 simulante segmentorum tertii et quarti ventralium rubro, ventre late rubro-limbato, connexivo nigro- et rubro-variegato.

♀ Long. 13, Lat 4 mill.

- H. annulato* L. valde affinis, colore partis inferioris capitis, prostethii, coxarum anteriorum, femorum intermediorum, tibiatarum omnium et ventris differt.

Ein einziges Weibchen wurde von Herrn Leder bei Suram im Mai aufgefunden und mir freundlichst überlassen.

- Pirates ululans* Rossi. Eine Larve am Salzsee von Kodi Anfangs April.

- \* *Corisa Jakowleffi* n. sp. Supra nigro-fusca, laevis, nitida; capite pallido, vertice postice infuscato; thorace postice producto, obtuso, lineis 12 transversis pallidis, posterioribus hinc inde fissis aut abbreviatis signato; hemelytris pilis nonnullis longis adpressis praeditis, flavido-lineolatis, lineis confertis eroso-undulatis et abbreviatis, membranam transeuntibus, clavo basi pallido, lineolis membranae angulato-flexuosis, partim confluentibus apicalibus brevibus radiatis; area marginali pallida, pone medium macula oblonga nigra et pone hanc lineolis transversis nigris notata; corpore subtus pallido, pectore medio maculisque connexivi nigris; tibiis intermediis compresso-dilatatis, unguiculis intermediis tarsis paullo brevioribus. Long. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—11, Lat. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mill.

♂ Fovea frontali plana, fere nulla, marginem anticum oculorum vix attingente; palis subparallelo-cultratis, obtusis, apicem versus vix latioribus.

♀ Fronte parce pilosa late cultratis.

- C. Panzeri* Fieb. proxima, sed statura latiore, vertice postice, area marginali hemelytrorum pone medium maculisque connexivi nigris, ventre unicolore pallido, tibiis intermediis compresso-dilatatis palorumque structura mox distinguenda.

Herr Dr. Puton erhielt von Jakowleff ein Männchen und mehrere Weibchen dieser Art, als aus dem Kaukasus stammend, aber ohne nähere Angabe des Fundortes. Er hatte die grosse Freundlichkeit, mir davon