

- Arnold, Icon. Clad. Nr. 1315 völlig übereinstimmend. Ziegelei in der Nähe des Glockenbergs bei Plauen [Stolle].
2. *truncata* (Floerk.) nicht gefunden.
- var. *scabriuscula* (Del.) Coëm.
1. *surrecta* (Floerk.) Wain. Steinicht, linkes Elsterufer; Waldrand am Weg vom Forsthaus nach der Holzmühle (mit Originalexemplaren Sandstedes völlig übereinstimmend).
2. *adpersa* Floerk. Am Kapellenberg bei Schönberg.
- var. *palamaea* (Ach.) Nyl. Sehr verbreitet auf sonnigen Felsen durch das ganze Gebiet, besonders m. *recurva* Floerk. Zwischen Echo und Holzmühle, am Waldrand; Wendelstein bei Falkenstein; sonnige Hänge bei Pirk [Stolle]; Syratal usw.
- m. *subulata* Floerk. Schönberg, Fußweg nach Steinsgrün.
116. *Cladonia rangiformis* Hoffm. Strasse von Syrau nach Elsterberg, am Waldrande [Stolle].
117. *Cl. squamosa* (Scop.) Hoffm. Im ganzen Gebiet sehr verbreitet.
- α) f. *denticollis* (Hoffm.) Floerk. Schönberg: am Weg nach Hohendorf; Syratal an feuchten Stellen.
- m. *squamosissima* Floerk. Kienmühle bei Schwand [Spindler]; Syrauer Wald [Stolle]. Mehlteuer, in feuchtem Moos.
- m. *asperella* Floerk. Waldboden um Jocketa, Plauen, Schönberg: an trockneren Stellen als vorige. Mit der nächsten die verbreitetste Form um Schönberg:
- asperella ad denticollis* (Hoff.) Floerk. Seltener bei Plauen und Jocketa.
- β) f. *muricella* (Del.). Auf Steinblöcken im Zwoschwitztal, am rechten Abhang des Syratals auf felsigem Boden.
- denticollis ad muricella* (Del.). Syratal, an gleichem Orte.
- denticollis ad phyllocoma* Rabenh. Wald zwischen Syrau und Elstertal [Stolle].
- asperella ad multibrachiata* Floerk. Syratal, Eingang zum Zwoschwitztal, auf feuchtem Boden. Beim Siegelfelsen zwischen Grünbach und Hammerbrücke [Stolle].
- Typische *multibrachiata* Floerk. habe ich noch nicht gefunden, aber ohne Zweifel findet sie sich an torfigen Stellen.
118. *Cl. cenotea* (Ach.) Schaer. Friedrichsmühle bei Morgenröte; Schönberg: Weg vom Kirchhof nach Steingrün; Syratal: rechtes Ufer, hinter der Brücke.
119. *Cl. caespiticia* (Pers.) Floerk. An sonnigen Felsen bei Pirk [Stolle].
120. *Cl. cariosa* (Ach.) Sreng. f. *pruniformis* Norm. Auf trockenen Felsen bei Pirk [Stolle]; Alt-Jocketa, auf den Höhen nach dem Triebtal zu.
121. *Cl. gracilis* (L.) Willd. Durch das ganze Gebiet in lichten Fichtenwäldern verbreitet.
- α) *chordalis* (Floerk.) Schaer. Die verbreitetste Form auf sandigem Boden um Plauen, Hammerbrücke, Ebmath, Schönberg.
- chordalis ad ecmocyna* Ach. Auf Waldboden zwischen Tauschwitz und Theuma.
- β) *aspera* Flk. Schönberg, am Kapellenberg: Wegböschungen.
122. *Cl. cornuta* (L.) Schaer. Schönberg, am Weg nach Hohendorf: an einem Baumstumpf; Syratal [Stolle].
123. *Cl. Botrytes* Hoffm. Bad Elster [Rabenhorst].