

214. *Parmelia glomellifera* Nyl. Ebenda. Der braune Farbstoff der Rinde wird von Salpetersäure blaugrün gefärbt!
215. *P. soorediata* (Ach.) Th. Fr. Auf Grünstein im Trieb- und Syratal, im Steinicht; auf Granit bei Schönberg und Hammerbrücke, nicht selten. Von Rabenhorst in Sachsen nur bei Leisnig gefunden.
216. *P. saxatilis* (L.) Ach. An Bäumen und Felsen durch das Gebiet sehr verbreitet, fruchtend gefunden im Syratal, bei Jocketa, Schönberg, Hammerbrücke, Fröbersgrün [Stolle].
var. *sulcata* (Tayl.). Pappeln am Kemmler bei Plauen; Ebereschen zwischen Muldenberg und Schöneck.
217. *P. omphalodes* (L.) Ach. Auf Quarzit des Hohen Steins bei Erlbach.
var. *panniformis* Ach. Auf Quarzit des Wendelsteins [Stolle].
218. *P. tiliacea* (Hoffm.) Ach. Auf Schindeln in Zwoschwitz. Pappeln am Kemmler; Kirschbäume bei Schönberg, hier kleine Apothezien tragend; Wegbäume bei Reinsdorf, 1883 mit Apothezien gesammelt.
219. *P. caperata* (L.) Ach. An Grünstein im Syratal, an einer Erle am Friesenbach bei Chrieschwitz: an beiden Standorten seit Jahren verschwunden. Jetzt nur noch zu finden an Felswänden im Trieb- und Elstertal.
220. *P. perlata* (L.) Ach. Schindeln eines Stalles in Eichigt bei Ebmath. An Fichten und Buchen bei Ebmath.
221. *Cetraria glauca* (L.) Ach. An Stämmen und Zweigen verschiedener Bäume, an bearbeitetem Holz, an Steinen bei Ebmath, Schönberg, Hammerbrücke häufig.
var. *fallax* Ach. Pfosten am forstlichen Pflanzgarten in Schönberg; an Fichtenzweigen bei Hammerbrücke und Mehlteuer.
222. *C. pinastri* (Scop.) Fr. An Fichtenwurzeln, -stämmen und -zweigen bei Hammerbrücke, Ebmath, Schönberg häufig; geht auch auf Granit über (Schönberg). Nie fruchtend gefunden.
223. *C. saepincola* (Ehrh.) Ach. An Fichten bei Schönberg; an Buchen im Burgstall bei Haslau und vor dem Hohen Stein. Auf Granit bei der Säuerlingsmühle bei Voitersreut (Böhmen).
224. *C. aleurites* (Ach.) Th. Fr. Schindeldach der Ossermühle bei Schönberg. Buchen unterhalb des Hohen Steins.
225. *C. islandica* (L.) Ach. Durch das Gebiet sehr verbreitet; bei Schönberg mit Apothezien, verkümmerte Exemplare mit Soralen bei Alt-Jocketa und Schönberg.
var. *crispa* Ach. Auf sandigem Boden bei Ebmath und Haselrain.
226. *C. aculeata* (Schreb.) Fr. Durch das Gebiet verbreitet, sehr häufig in sandigen Gebieten, wie bei Mehlteuer, Ebmath.

XIV. Usneaceae.

227. *Evernia divaricata* (L.) Ach. Zwischen Frössen und Gfell von Wenck (nach Rabenhorst) gefunden, im sächsischen Vogtland vergeblich gesucht.
228. *E. prunastri* (L.) Ach. Durch das Gebiet verbreitet, aber viel seltener als
229. *E. furfuracea* (L.) Mann. Auf den verschiedensten Baum- und Straucharten, auf bearbeitetem Holz. Auch auf Granit im ganzen Gebiet gemein.