

\* *Ophonus diffinis* var. *rotundicollis* Frm., selten.

— *puncticollis* Payk., selten.

\* — *rotundatus* Dej., selten.

— *calceatus* Duft., selten.

*Harpalus psittaceus* Fourcr., selten.

— *rubripes* Duft., selten.

\* — *dimidiatus* Rossi, nicht selten, im März auch unter Steinen auf dem Gipfel des Monte Bignone.

*Bradycellus verbasci* Duft., 2.

*Acupalpus meridianus* L., 1 St. von der Strandlehne.

\* *Licinus silphoides* Rossi, selten an der Strandlehne.

— *granulatus* Dej., ebenso.

*Metabletus truncatellus* L., 1.

— *foveatus* Fourcr., 1.

*Blechrus maurus* Sturm, nicht selten im Gesiebe.

*Dromius linearis* Oliv., 1.

— *meridionalis* Dej., 1.

— *fenestratus* F., 1.

*Dytiscidae*: 15.

\* *Haliphus badius* Aub., im Bernardo- und Lorenzobach nicht gar selten.

— *lineatocollis* Marsh., in allen Bächen gemein.

\* *Cnemidotus rotundatus* Aub., im Bernardo-Bache nicht selten.

\* *Bidessus bicarinatus* Latr., nicht selten.

— *delicatulus* Schaum, häufig, besonders im Bernardo und Lorenzo.

\* *Deronectes moestus* Frm., ziemlich häufig.

\* *Hydroporus crux* F., ziemlich selten.

— *varius* Aub., nicht selten.

— *halensis* var. *fuscitarsis* Aub., nicht selten.

\* — *limbatus* Aub., selten.

\* — *obsoletus* Aub., selten.

*Laccophilus interruptus* Panz., gemein.

\* *Agabus brunneus* F., ziemlich selten.

— *biguttatus* Oliv., 1.

— *bipustulatus* L., selten.

*Gyrinidae*: 1.

*Gyrinus urinator* Ill., häufig.

*Hydrophilidae*: 25.

\* *Hydrous pistaceus* Lap., 1 St. im Bernardo-Bache.

*Helochares erythrocephalus* F., sehr selten.

*Anacaena bipustulata* Marsh., häufig.

— *globula* Payk., nicht selten.

\* *Laccobius gracilis* Motsch., selten.

— *nigriceps* var. *maculiceps* Rottbg, selten.

— *scutellaris* Motsch., gemein.

— — var. *atratus* Rottbg, seltener.

— — var. *minor* Rottbg, nicht selten.

\* *Limnebius nitiduloides* Baudi, nicht häufig.

\* — *dissimilis* Kuw. n. sp., häufiger, besonders im oberen Lorenzo bei San Pietro.