

Attidae: 20.

Epiblemum cingulatum Panz., 1 erwachsenes Weibchen.

— *scenicum* Clerck, 1 desgl. In ganz Europa, Nordafrika, Madeira; auch Nordamerika.

— *zebraneum* C. L. Koch, 1 desgl.

**Dendryphantes nidicolens* Walckenaer. 4 junge Stücke. Die Art scheint im ganzen Mittelmeergebiete vorzukommen und ist aus Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, Syrien und Algier bekannt.

**Cyrba algerina* Lucas. Ueber 20 Stück beiderlei Geschlechts, aber vorwiegend Weibchen. Die Art ist in allen Mittelmeerländern verbreitet und an trockenen, sandigen Stellen gemein; nach Norden scheint sie über Norditalien und Südfrankreich hinaus nicht vorzudringen. Thorell erhielt sie auch aus Sumatra (Siboga) und giebt ihre Verbreitung durch Turkestan, Indien, Birma an.

Philaeus chrysops Poda, 1 junges Weibchen. Eine entschieden südliche Art, die in Italien, Südfrankreich, Südtirol (Eisackthal, auch im Ahrthal bei Taufers) häufig, schon in Nordfrankreich und Süddeutschland aber selten vorkommt. Nach Grube's, von Thorell, wie es scheint, nicht bezweifelten Angabe findet sie sich auch in den Ostseeprovinzen; ihr Vorkommen in Schweden scheint aber nicht vollständig verbürgt zu sein. Menge's gleichnamige Art ist eine von unserer Spinne verschiedene, wie Menge selbst schon vermuthete.

— *bicolor* Walckenaer, 1 Weibchen.

Heliophanus cupreus Walck. 5 junge Exemplare eines *Heliophanus* ziehe ich zu dieser häufigen und verbreiteten Art, mit der dieselben in der Färbung übereinstimmen; bei der grossen Aehnlichkeit der *Heliophanus*-Arten und bei der Unzuverlässigkeit der nur von der Färbung hergenommenen Merkmale bleibt freilich die Bestimmung jugendlicher Stücke immer unsicher.

— *armatus* E. Simon, 6 jugendliche Stücke. Ueber die Sicherheit der Benennung gilt dasselbe wie bei voriger Art.

**Icius striatus* Walck., 8 Stücke dieser in Südfrankreich verbreiteten und häufigen Art.

**Menemerus semilimbatus* Hahn, 1 Männchen und 2 Weibchen. Die Art ist, wie die verschiedenen ihr von Lucas, C. L. Koch und Blackwall gegebenen Namen beweisen, im Mittelmeergebiet verbreitet und häufig: bekannt ist sie aus Spanien, Italien, Korsika, Korfu, Griechenland und Algier.

Pellenes Bedelii E. Simon, 1 Weibchen dieser schönen Art, die Simon von Digne, Herman aus Ungarn beschrieb; ich fand sie wiederholt im Mainzer Becken bei Ingelheim.

**Ergane jucunda* (Lucas) E. Simon. 7 Stück dieser in Spanien, Südfrankreich, Italien, Algier, Griechenland und Syrien verbreiteten Art.

— *arcuata* Clerck. 15 junge Spinnen dieser Gattung ziehe ich nach der Färbung zu dieser Art, die wohl über ganz Europa verbreitet ist und sich bei uns mit Vorliebe auf Sumpfwiesen aufhält. Die Geschlechtsreife der Art tritt im Juli ein.

Attus terebratus Clerck, ein junges Männchen. Diese Art scheint mehr dem Norden anzugehören und im Süden erst wieder in den Alpen häufiger aufzutreten. In Schweden, Norddeutschland scheint sie nicht