

Cinera Misnensis prope Risam ad Albim. Liechtgrawer Than von Riss.
 Lutea Misnensis. Schön gelber Than.
 Fulva Annebergia in Pila monte. Gelber Than.
 Rubricae fabrili similis e pago Ocrolla.

Marga.

Cinerea mediocris, quae reperitur inter Dresdam et Misenam. Liecht
 aschenfarber mergel.

Fulva crustacea Radebergensis, quae reperitur in terra arenosa aurum
 in se continens. Geler schirblichter Goldmergel.

Medulla.

Candida et fluida saxorum Rochlicensium.

Lutea geodi inclusa, ochrae non dissimilis, quae circa Francobergam
 in Misnia cum lithanthrace reperitur. Gelb steinmarck in hollen-
 steinen.

Rubra mollis; incandida rubra saxorum Rochlicensium.

Picea saxorum Pirnensium. Schwarz steinmarck / Bech gleich.

Viridis saxorum Chemnicensium supra Hilbersdorfium.

Bolus.

Annebergius. Gebingescher bolus.

Creta.

Lutea mollis Vualdenburgica etc.

Ochra.

Innata ferri lapidibus, effossa Francobergi ad Tschopam amnem.

Innata et annata lapidi plumbario, Fribergensis. Freibergisch ochra.

Succi nativi.

Alumen.

Misnense, quod foditur in villis Heruigisdorfo et Burgo.

Atramentum.

Radebergense, cum sulfure mixtum. Radebergisch kupfferwasser mit
 schwebel vermischt.

Chrysocolla.

Nativa Snebergensis in Misnia, in lapide metallico aerario. Berckgrün
 in einem kupfferertz.

Coeruleum.

Nativum insigne glebosum Snebergense, intus concavum. Schön blaw
 lasur kuglen / die inwendig hol / und in einer weissen grisslechten
 erden gefunden werden.

Nativum Gishubelianum in pyrite. Ein bercklasur in einem gar
 schönen kupffer kiess / darauss täglich ein grawe farb wechsst.

Pyrites Radebergensis, ex quo misy, melanteria et atramentum tenue
 album distincte efflorescunt.

Pyrites Fribergius, cum sterili plumbagine ex qua sulfur educitur: qui
 foditur copiose ad Albim Scharfenbergi.

Succi pingues.

Carbones bituminosi, molles et fissiles qui non procul a Dresda effodiuntur.
 Weiche steinkolen.