

- Stereocaulon condensatum* HFFM. Halde „Schaller“ c. fr.
St. coralloides FW. An den großen Felsen des Gebiets; namentlich h. und c. fr. Schimmelfels, Teufelsstein, Kanzelstein.
St. paschale (L.) HFFM. Halde „Grauer Mann“.
St. saxonicum E. BACHM. Halde „Grauer Mann“ an Phyllitgeröll.

Gyrophoraceae

- Gyrophora cylindrica* (L.) ACH. v. *fimbriata* NYL. s. im Gebiet. Schimmelfels und Teufelsstein c. fr.
G. erosa (WEB.) ACH. Schimmelfels, c. fr. auf den Plattformen der größeren Phyllitfelsen n. h.
G. deusta (L.) ACH. Schimmelfels, in reichlicher Menge, aber s. fruchtend.
G. hyperborea ACH. Schimmelfels z. s., aber stets fruchtend.
H. polyphylla (L.) FUNCK. s. h. Schimmelfels, Teufelsstein, Kanzelstein, immer st.

Acarosporaceae

- Biatorrella moriformis* (ACH.) TH. FR. fo. *saxicola*. Steinbachtal, auf Granit mehrfach. (Rittersgrün: Fritschberg auf Phyllit.)
Acarospora fuscata (SCHRAD.) TH. FR. Überall h. auf allerlei Gestein bis auf den Auersbergturn.
 var. *rufescens* (TURN.) TH. FR. Steinbach, Breitenbrunn.
A. sinopica KBR. c. fr. auf den Bergwerkshalden von Steinbach, Joh. und Jugel n. s.

Peltigeraceae

- Peltigera canina* (L.) WILLD. Sauschwemme und Halden von Joh., Jugel und Steinbach.
 fo. *subcanina* (GYELN.). Sauschwemme c. fr. Ist ein Ergebnis feuchter Orte oder Jahre, daher nicht als Art berechtigt.
P. spuria (ACH.) DC. c. fr. Sauschwemme 860 m, z. h.
P. rufescens (WEIS) HUMB. Sauschwemme, ehemalige Halden c. fr. Weiters Glashütte: Tannenweg, st.
P. malacea (ACH.) FUNCK. st. Steinbach, Halde Wilder Mann.

Pertusariaceae

- Pertusaria amara* (ACH.) NYL. Ebereschen und Buchen um Steinbach, Wildental, Jugel, Schwarzwassertal.
P. globulifera (TURN.) MASS. An Buchen in Wildental, am Auersberg, Steinbach nach dem Rehhübel, Schwarzwassertal, teste ERICHSEN.
P. corallina (L.) TH. FR. Schwarzwassertal b. Erlabrunn auf Blöcken h. Teufelsstein, Riesenberg, st.
P. Wulfenii (DC.) DARB. fo. *cinerea*. Auersberg, an einer Buche der Nordseite reichlich und c. fr. teste ERICHSEN.