

Gegenden im obern und südlichen Teile von mir nicht besucht werden konnten, es mir auch an Mitarbeitern fehlt.

Eine von mir beabsichtigte pflanzengeographische Arbeit, die wegen der Verschiedenheit der klimatischen, geologischen und sonstigen Verhältnisse vielleicht ersprießlich wäre, muß aus diesem Grunde unterbleiben.

Plauen, im April 1914.

### Nachtrag zum Standorts-Verzeichnisse.

- Potamogeton natans* L. var. *rotundifolia* Bréb. Weischlitz: in einer Elsterlache.
- P. crispus* L. Rittergutsteich in Rosenberg bei Weischlitz.
- Aira caespitosa* L. var. *setifolia* Bischoff. Bei Morgenröthe (Stolle)!
- Melica uniflora* Rtz. Oberweischlitz.
- Allium oleraceum* L. Nicht selten bei Weischlitz.
- Polygonatum officinale* All. Auf dem Lastpöhl bei Oberweischlitz.
- Platanthera viridis* Lindl. Bei Schwand.
- Betula pubescens* Ehrh. Bei Muldenberg.
- Alnus incana* DC. Bei Mühlleithen und Muldenberg.
- Viscum austriacum* Wiesb. Auf Tanne bei Jocketa im Triebtale.
- Rumex aquaticus* L. Im Elstertale bei Weischlitz.
- Anemone ranunculoides* L. Im Elstertale bei Pirk und Weischlitz.
- Actaea spicata* L. Im Jöfsnitztale zwischen Kröstau und Kürbitz.
- Papaver Rhoeas* L. Bei Weischlitz sehr selten.
- Barbarea arcuata* Rchb. Neustädter Höhe bei Falkenstein (Ebert)!!
- Arabis arenosa* Scop. Zwischen Planschwitz und Bösenbrunn. Bei Falkenstein (Ebert)!
- Camelina microcarpa* Andr. Bei Plauen.
- Thlaspi alpestre* L. Poppengrün bei Falkenstein.
- Lepidium Draba* L. Bei Falkenstein (Ebert).
- L. campestre* R. Br. Zwischen Taltitz und Oelsnitz.
- Reseda Luteola* L. Oelsnitz: im Elstertale oberhalb Dobeneck in großer Zahl.
- Viola Riviniana* Rchb. Bei Weischlitz.
- Hypericum hirsutum* L. Im Elstertale bei Geilsdorf.
- Malva Alcea* L. Bei Weischlitz und Steins.
- Geranium phaeum* L. Fehlt im Vogtlande. — Die Angaben in den Vorarbeiten und Nachträgen sind irrtümlich.
- G. silvaticum* L. Schöneck: Bei Eschenbach und Gunzen (Fickert)!! Zaulsdorfer Höhe bei Oelsnitz (Fickert)!
- G. molle* L. Bei Tobertitz.
- Polygala depressa* Wend. Bei Kornbach.
- P. Chamaebuxus* L. Bei Plauen durch Kultur bis auf einen kleinen Rest beseitigt.
- Cerastium semidecandrum* L. f. *glutinosum* Fr. Bei Weischlitz.
- Melandrium noctiflorum* L. Bei Oberweischlitz, unter *Trifolium hybridum* in Massen (1912).
- Cornus sanguinea* L. Im Buchenwalde bei Gutenfürst, 560 m.
- Anthriscus cerefolium* Hoffm. Im Dorfe Oberweischlitz an der Straßensböschung verwildert.
- Chrysosplenium oppositifolium* L. Im Meißnerbache bei Unterweischlitz.