

[*Cobitis taenia!*] usitato“ und (p. 293): „Circa Albim fl. quidam etiam Lampredam minimam Steinbeyſs vocant.“*)

Unter die Fische „e mari ascendentes“ rechnet fälschlicherweise — allerdings nur im 2. Verzeichnis — Kentmann auch den „Silurus“ (II), den Wels (I), *Silurus glanis* L., „De eo nuper“, so heißt es bei Gesner (p. 875), „Ioan. Kentmanus medicus sic ad me scripsit. Velsus est e numero piscium qui e mari in Albim subeunt**), et in eo manentes proficiunt pariuntque. Corpus ei fuscum, nigris maculis plenum, squamae nullae: corium satis crassum et lubricum. caput grande, latum et simum. Rictus oris amplus, et ad capitis latitudinem patulus: labia supra infraque aspera, quibus praedam retinet. dentibus enim caret. A labro inferiore dependent barbulae quaternae tenues, molles, oblongae: a superiore vero binae, durae, longissimae. venter est magnus, deformis. cauda tenuis et lata, ad quam usque pinna ab ano extenditur. Utrique ad branchias pinnae adjunctus est aculeus quidam durus, osseus, quibus infestos sibi pisces arcet. Toto copore unicam spinam extensam habet, sicut mustela illa fluviatilis, quam nostri Quappam nominant. Parit in Albi, crescitque multum et pinguescit tum ipse tum foetus: et similiter in lacubus ac stagnis, ubi praeda copiosa solus potitur. et enim admodum vorax piscis, et eo nomine ubicunque est damnosus: quamobrem non temere piscinis immittitur. Inter pascha [Sonntag Quasimodogeniti] et pentecosten e mari ascendens, ut in dulcibus aquis pariat, plurimum capit: quanquam toto fere anno capi solent, sed parvi, a binis libris pondere ad senas usque. Maximi vero qui circa partum capiuntur, libras circiter vigenas ultra centenas appendunt. Libra fere numo quem grossum vocant, venditur. complement autem grossi xxi. florenum, id est drachmas fere sedecim***).

*) Joh. Sigismund zählt in seinem Manuskript (16. Jahrh.): „Die mancherley Arten der Fische, die in dem Neißflusse, in Oberlausitz, sich finden und gefangen werden“ (Nachlese Oberlausitzer Nachrichten, IV. Stück, 1766, S. 105) „Steenbeſſen, Lumbrici“ auf. — Nach dem Archiv für Fischereigeschichte (Heft 3, Berlin 1914, S. 231) kommt „Steynbys“ in einer Straßburger Handschrift des 16. Jahrhunderts sofort nach der „Lempfrit“ (*Petr. marinus*) und dem „Berlin, des lempfritten Bruder“ (*P. fluv.*). Leider gibt Joh. Schultze in der Fußnote nur den Namen „Steinbeißer“, der eben leider nur zu oft auch auf die Steinschmerle, *Cobitis taenia*, angewendet wird. In dem unterdessen von mir in der Dresdner Bibliothek aufgefundenen ältesten deutschen Fischbüchlein (Erfurt 1498), über das ich nächstens im Archiv f. Fischereigeschichte berichte, ist die Reihenfolge die gleiche.

**) Durch Kentmanns falsche Beobachtung ließ sich Gesner verleiten, den Wels unter die Wanderfische zu stellen: „Nos Glanim [*Silurus glanis*] supra inter fluviatiles simpliciter posuimus: Silurum vero hic inter anadromos. quoniam e mari flumina subire, inque eis parere, manere, et proficere ex Io. Kentmanno didici“ (Nomenclator, p. 329).

***) Zum Vergleiche dieses damaligen Fischpreises drucke ich eine Dresdner Preisliste vom Jahre 1569 hier ab:

UNGEFEHRLICHER FISCHKAUF ZU DRESDEN (ANNO 1569).

Ein schock grüner hechte, als 20 grosse, 20 mittelmessige und 20 der kleinen, umb zehn guldens.

Ein schock karpfen, als 20 der grossen, 20 der mittelmessigen und 20 der kleinen, umb sex guldens.

Der zoher speisefische wirdet umb einen thaler bezahlet.

Einen centner grüner hechte umb 10 fl. 15 gr., karpfen umb 5 fl. 7 gr. 6, karas umb 4 fl. 6 gr., streifperschken umb 4 fl. 6 gr.

Ein schock kaulperschken umb 10 gr., neunogen umb 1 fl. 14 gr.

Eine kandel schmerreln 6 gr., elldritzen 6 gr., steinbeissen 10—12 gr., kaulheubt 7 gr.

Ein pfund grunen lax, darnach die zeit ist, umb 4, 5, 6 gr., wels umb 2 gr., stör umb 2 gr. 6.