

manus veluti matulam tenentis, complectatur. Maximi in Albi bilibres fere sunt: hoc est, unciarum xxxij. Piscis hic anno toto e rivis in Albim migrat. Circa brumale solstitium [21. Dez.] et nativitatem Domini parit: quo tempore, nisi glacies impedit, plurimus capit, et in cibo tunc optimus est. Bonus et sapidus est piscis. Simpliciter quidem in aqua fontana (cui cum primum fervore occœperit, immittitur et conditur) ad iuris fere consumptionem elixus: affuso demum etiam vino, (mit einem weyn abgekület /) optime sapit. Iecur eius imprimis inter delicias censemur: et omnium qui in Albi piscium jecori praefertur. Alios etiam pisces, quibus cum elixatur Olrupa, sapidores reddit. Spina huius piscis arida contrita, drachmae unius aut dimidia (pro aetatis ratione) pondere, infantibus et pueris adversus comitiale morbum [Epilepsie], miro successu propinatur e stillatatio liquore florum tiliae, ut a praestantissimo Haldensis [Hallensis] episcopi medico Georgio Laurea\*) accepimus: qui et seipsum frequenter hoc remedio usum, et alios subinde feliciter utentes observasse retulit.“

Den Hauptvertreter der heutigen Barbenregion, die Barbe, *Barbus fluviatilis* Ag., nennt Kentmann „Parme“ (I, Barbe II), ein Name, der noch heute von der Elb bevölkerung dafür gebraucht wird. Von anderen Fischen der Barbenregion führt Kentmann den „Streifbersing“\*\*\*) („*Perca*“, II), Streifbarsch, *Perca fluviatilis* L., den „Kaulbersing“ („*Percae* similis ille quam nos Porcum Nili interpretamur“, II), Kaulbarsch, *Acerina cernua* L., den „Hecht“\*\*\*), *Lucius esox* L. und den „Karp“, Karpfen, *Cyprinus carpio* L. an†).

Von den Cypriniden behandelt Kentmann ausführlicher die Karausche†††), *Carassius carassius* L., die er mit dem jetzt noch im Slavischen gebräuchlichen Namen „Karas“ (latinisiert als „Charax“, II) bezeichnet. Er unterscheidet in der Elbe drei Varietäten. „Primi generis pisces sunt parvi, tenues, lati, colore subaureo, cui circa dorsum fuscus admiscetur. dupla eis ad latitudinem longitudo: caput parvum. Pinna dorsi et cauda, fusci coloris sunt: reliquae vero quinque pinnae, e fusco punicei. Squamae ut in Cyprino. Genus hoc Miseni parvum cognominant, klein Karaffs: vel (a colore) Giblichen†††). Vivaces sunt admodum, (Sind eines sehr harten Lebens.) E piscinis et stagnantibus aquis in Albim veniunt: in eoque augentur et pariunt. Raro octo digitos longitudine excedunt. Vescuntur

\*) Dr. Georg Lauer, fürstlicher Leibarzt in Halle (vgl. K. v. Weber: Anna Churfürstin zu Sachsen. Leipzig 1865, S. 425).

\*\*) In der Fischersprache am Neckar heißt der Barsch heute noch Bersching (L. Sütterlin in der „Zeitschr. f. deutsche Wortforschung“, VI, 1904/05, S. 73).

\*\*\*) „In Albi, alii a Martio mense Mertzenhecht vocantur: alii post pascha, grosse hecht“. (p. 502).

†) Fabricius führt in seinem Verzeichnis außerdem noch den geschlechtslosen Karpfen auf: „Leiner vel Morfling. Carpiones quibus neque lactes neque ova sunt“. Über sterile Karpfen vgl. Siebold, a. a. O., S. 89—91.

††) Die Form „Karausche“ ist erst seit 1734 belegt. (Kluge: Wörterbuch der deutschen Sprache. 7. Aufl. Straßburg 1910, S. 230). — Der erste Beleg findet sich im „Vocabulorum rerum promptuarium a Baldassare Trocho“ (Lipsiae 1517, p. J b): „Carutius ein karutzchen.“

†††) M. E. Bloch (Oeconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands, I, Berlin 1782, S. 71—75) hat diese gestreckte Form, die noch jetzt den Volksnamen „Giebel“ führt, unter dem Namen *Cyprinus Gibelio* als besondere Art in das System eingeführt, während J. Th. Klein (Historiae piscium naturalis promovendae missus V, 1749, p. 60, tab. XI, fig. 1, 2) und N. G. Leske (Ichthyologiae Lipsiensis specimen, Lipsiae 1774, p. 78—79) den Giebel nur als Artabänderung betrachteten.