

Andromeda polifolia L.

- 9*). Ortrand: im Schradenwald (Reichenbach, Fl. Sax. 1844).
 9b. Ruhland (Wünsche, Exc. Fl. 1895).
 22. Königswartha (Reichenbach, Fl. Sax. 1844; Nitzsche 1874!).
 23. Caminau: am Steinbruchteich, 134 m (Drude u. Schorler 1900!!).
 39. Klix: bei Neudorf (Wünsche, Exc. Fl. 1887).
 40. Niesky (Reichenbach, Fl. Sax. 1844).
 51. Radeberg: bei Ottendorf (Reichenbach, Fl. Sax. 1844).
 98. Brand: Groß-Hartmannsdorf (Reichenbach, Fl. Sax. 1844). Sehr isolierter Standort, der einer Nachprüfung bedarf.
 119. Altenberg: Zinnwald (Reichenbach, Fl. Sax. 1844).
 131. Neuwernsdorf: südöstlich vom Rothen Hübel, 750 m. (Stiefelhagen 1897!).
 136. Schneeberg: bei Jahnsgrün im Hochmoor südwestlich vom Filzteich, 565 m (Reichenbach, Fl. Sax. 1844, Schorler 1903!!).
 140. Reitzenhain: im Forstrevier Kühnhaide (Artzt 1880); in der Keilhaide und anderen Hochmooren zwischen Reitzenhain und Kühnhaide, 750 m. Satzung: Hochmoor bei Ulmbach, 840 m (Schorler 1905!!).
 144. Bei Jägersgrün (Köhler).
 145. Carlsfeld (Reichenbach, Fl. Sax. 1844), im Kranichsee, 915 m (Drude 1888!!). Eibenstock: zwischen dem Baumanns- und Keilberg bei Schönheide (Köhler 1885).
 146. Johannegeorgenstadt (Reichenbach, Fl. Sax. 1844).
 147. Gottesgab: in den Torfmooren am Spitzberg, 1000 m (Reiche 1889!! und Schorler 1902!!). Neudorf: in der Siebensäure, 800 m (Schorler 1902).
 148. Prefsnitz: am Hafsberg, 880 m (Drude u. Schorler 1905!!). In den Mooren zwischen Schmiedeberg und Kupferberg, 850—900 m (Schorler 1902).
 153. Frühbufs: im Filzbrucker Wald, 800 m, und bei Unter-Frühbufs, 885 m (Schorler 1895!!). Bei Hirschenstand, 920 m (Schorler 1895!!).
 153a. Bei Abartham, 900 m (Schorler 1902!!). Zwischen Bäringen und Platten (Köhler 1893).

Trientalis europaea.

20. Otterschütz: bei Zietsch im schattigen Walde (Schulz 1894). H. Dr.**)
 26. Liebertwolkwitz: im südwestlichen Teile der Harth (Klett und Richter 1830).
 27. Naunhof: im Universitätsholze (Klett u. Richter 1830); bei Otterwisch (Kuntze 1867).
 35. Königsbrück: bei Glauschnitz im Walde auf moorigem Boden (Schulz 1893). H. Dr.; am Keulenberg (Müller 1896). H. Dr.
 36. Kamenz: bei Jesau (Schulz 1890). H. Dr.
 39. Baruth: Gröditz in der Skala (Rostock 1889).
 42. Bei Borna: (Kuntze 1867).
 43. Lausigk: in Wäldern (1830) H. Dr.; zwischen Lausigk u. Buchheim und bei Kitzscher (Wolfram 1878).

*) Nummern der Sektionen der Topographischen Karte von Sachsen.

***) H. Dr. = Herbarium Dresdense.