

*nitum Vulparia* (= *Lycocotum*).<sup>o</sup>  
Wenige Standorte von Hirschberg-  
bleilöcher bis zur Wisenttal bei  
Schleiz.

*ium Martagon*: Heinrichstein!  
bleiberge: EZ!

*ulegia vulgaris*: r. Hirschberg-  
Burgk!

*allorrhiza innata*<sup>o</sup>: r. Weidmanns-  
eal und Schleizer Wald bei Miele-  
orf: EZ!

Artgruppe des Hügellandes.

*urnum Lantana*<sup>oo</sup>: r. Heinrich-  
stein!

*mbucus Ebulus*<sup>o</sup>: EZ! und 3 Stand-  
orte Gottliebstal-Burgk bei Müller.

*Atropa Belladonna*: sp. cop.

*Hepatica triloba*: frq. an guten Stand-  
orten.

*Lathyrus niger*: r!, *vernus*: h. frq!

*Asarum europaeum*: h. frq.

*Asperula odorata*: h. frq.

*Carex brizoides*: scheint selten zu  
sein; sp. greg.

— *digitata*: h. frq.

*Melica nutans*: frq!

— *uniflora*: h. frq.

*Dentaria bulbifera*: (n. v!) — rr. bei  
Burgk.

*Euphorbia dulcis*, im Vogtlande,  
z. B. Neumühle bei Greiz selten,  
scheint im Saaledurchbruchwald zu  
fehlen.

## B. Felsformationen.

### Ass. und E-Ass.

I. Lichte Haine mit Pinetum.  
Aufgelöste submontane Wälder mit  
Coryletum.

Si.-Gruppe auf Diabas  
und Schiefer.

*aniperetum communis*: sp. —  
cop.<sup>1</sup>

*abus thyrsoideus* \* *candicans*

Whe: sp.

*ytisus nigricans*: frq! bis zum  
Sormitztal.—(Ob im Frankenwalde?)

*igitalis ambigua*: frq. cop.<sup>3</sup> bis  
Eichicht!

*riganetum vulgare*: frq.

*rifolietum medii*: h. frq.

*lene inflata*: frq. cop., *nutans*: h. frq.

*ynanchetum Vincetoxici*: frq!  
und auf Geröll der Bergwälder auf-  
steigend bis über 500 m!

*ula Conyza*: sp. durch das Tal.

*Malva Alcea*: h. frq!

*Lathyrus silvester*: frq. cop.<sup>1</sup>

*Vicia* (*Ervum*) *cassubica*: sp. cop.<sup>3</sup>

*ypericum montanum*: sp.

*erbascum nigrum*: frq. cop!

*erratula tinctoria*<sup>oo</sup>: sp. besonders  
auf den Uferfelsen.

*Dipsacus pilosus*: sp. (Burgk! Mehlis:  
EZ!)

II. E-Ass. der mesohygrophy-  
tischen Polsterdecken- und Fels-  
spalten-Stauden.

#### a. Montane Si.-Gruppe.

*Saxifraga decipiens* var. *bohe-  
mica* Panz.<sup>o</sup> (s. S. 42).

*Dianthus Seguieri*<sup>oo</sup>: frq. entlang  
der Saale.

*Dianthus caesius*<sup>o</sup>: noch mehr  
verbreitet als *Cotoneaster*.

*Viscaria vulgaris*: sp. auf Diabas und  
Schiefer.

*Sedum rupestre*<sup>o</sup>: frq. cop. bis  
Saalfeld!

*Allium Schoenoprasum*<sup>oo</sup>: frq. cop!  
am Ufer.

*Asplenietum septentrionalis*:  
frq. cop.<sup>2</sup>!

— *Trichomanis*: frq. cop.<sup>3</sup>!

— *× germanicum*: sp. (s. S. 43).

*Woodsia ilvensis* \* *rufidula*<sup>oo</sup> (s. S. 43).

*Lycopodium Selago*: rr, Leutenberg,  
Rosental: EZ!