

- | | |
|--|--|
| <p>? <i>Heleocharis ovata</i>
 <i>Scirpus maritimus</i>
 — <i>pauciflorus</i> Lightf.
 <i>Blysmus compressus</i> Panz.
 <i>Carex cyperoides</i> L.
 ? — <i>Pseudocyperus</i> L.
 — <i>lasiocarpa</i> Ehrh.
 — <i>tomentosa</i> L.
 <i>Cladium Mariscus</i> (L.) R.Br.
 <i>Epipactis microphylla</i> Sw.
 <i>Trollius europaeus</i> L.
 <i>Anemone Pulsatilla</i> L.
 <i>Ranunculus flaccidus</i> Pers.
 — <i>sardous</i> Cr.
 <i>Subularia aquatica</i> L.
 <i>Drosera anglica</i> (Huds.) Sm.
 <i>Potentilla norvegica</i> L.
 <i>Medicago minima</i> (Z.) Bartl.</p> | <p><i>Hippocrepis comosa</i> L.
 <i>Callitriche hamulata</i> Ktz.
 <i>Elatine Alsinastrum</i> L.
 <i>Viola stagnina</i> Kit.
 <i>Trapa natans</i> L.
 <i>Hippuris vulgaris</i> L.
 <i>Cicuta virosa</i> L.
 <i>Sium latifolium</i> L.
 <i>Oenanthe fistulosa</i> L.
 <i>Ledum palustre</i> L.
 <i>Lysimachia thyrsiflora</i> L.
 <i>Gentiana verna</i> L.
 <i>Myosotis sparsiflora</i> Mik.
 <i>Stachys germanica</i> L.
 — <i>recta</i> L.*)
 <i>Orobanche caryophyllacea</i> Smith.*)
 <i>Phyteuma orbiculare</i> L.
 <i>Thrinicia hirta</i> Roth.</p> |
|--|--|

Dazu kommen noch die im ersten Teile dieses Beitrages S. 46—49 aufgezählten Arten, die mit dem Zeichen °° hinter dem Namen versehen sind.

*) Die beiden Arten sind erst 1906 durch E. Hartenstein für die Landschaft bekannt gemacht worden, in den Beiträgen zur Flora des Reufsischen Oberlandes in dem 46.—48. Jahresber. d. Ges. v. Freunden d. Naturwiss. in Gera. *Stachys recta* hat danach nur einen Standort „vor dem Kalk-Lamprophyrbuch hinter dem Arbeitshaus bei Schleiz“, während *Orobanche caryophyllacea* im Juni 1897 zu Hunderten auf dem Geisler bei Löhma wuchs.