

gedehnten Rasen, an Felsen oft unter andern Moosen. Noch im **Erz.** bei Schwarzenberg 1801 X.! u. Zöblitz, Serpentinsteibrüche 620 m c. fr. Mö.!! **Lzb.** NB. Tollenstein 1910 We.!!

v. *angustata* Wils. **Elb.** Müglitztal: Lederbergsteig b. Schlottwitz an Porphyr- u. Schieferfelsen Ri.

117. *T. latifolia* Bruch. s. u. fast immer st. **Elst.** Leipzig s. z. und sp. Ko. An Pappeln der Leipziger Landstraße b. Halle sp. u. s. fr. **Vgt.** An Baumstümpfen u. Steinen einer Brücke der Lippoldsmühle b. Mühltröf Sp. Mühltröf: an Erlen u. auf Steinen a. Bache b. Langebuch St.! **Mld.** Lausigk an Nußbäumen c. fr. — ?! **Lzb.** Niederneukirch, in der Wesenitz an Steinen! Ebenso Ober-Putzkau, auf Granitblöcken am Ufer der Wesenitz Scha. NB. Alte Weiden am Biberbache b. Neuschloß b. Böhm.-Leipa A. Schmidt.

118. *T. papillosa* Wils. s. z. und nur st., Früchte in Australien u. Neuseeland gefunden worden, in Europa noch nicht. **Vgt.** Esche im Gutshofe in Unter-Neundorf, an Weiden bei Kröstau, an Alleepappeln a. Kemmler b. Rodersdorf Sp. Im **Elb.** wohl durch die Beseitigung der alten Alleepappeln ganz verschwunden. Noch im letzten Jahrzehnt zw. Pirna-Hermsdorf (b. Schweizermühle) u. zw. Pillnitz-Copitz (bei Graupa) Ri., St. Meißen: b. Siebeneichen Rbh. (ob noch vorh.?) Dagegen hat d. Moos noch Heimat in d. **Lzn.** Zw. Bautzen u. Hoyerswerda Rbh. Hermsdorf b. Königswartha an Weiden 1919 Ri.; Bernsdorf 1899 Krieger!; um Uhna Trau.; Göda b. Bautzen an Weiden nach Preske zu Feu.!! An Weiden in Nedaschütz Ri., Feu., Wi. Bautzen: unterh. der Stadt am Spreeufer an Alleepappeln b. d. Weiten Bleiche 1922 Ri. **Lzb.** Pappel b. Cunewalde Scha.!

119. *T. pulvinata* (Jur.) Limp. Noch seltner als vorige u. nur st. **Elst.** Leipzig s. z. u. sp. Ko. **Elb.** Meißen: im Seußlitzer Park an alten Obstbäumen sp. St. **Lzn.** Göda: Apfelbaum Feu.!! Ober-Gurig an Holunder (*Sambucus nigra*) in Menge Ri., Feu., Wi. 1922.

120. *T. laevipila* (Brid.) De Not. s. s. **Lzb.** Steinigtwolmsdorf August 1903 c. fr. W. Krieger in Herbar Wo. Nr. 434! Bisher einziger Standort in Sachsen.

121. *T. montana* (Nees) Lindb. s. und nur st. **Vgt.** Auf Felsen im Steinicht b. Plauen St. Brecciefelsen unterh. der Rentzschmühle s. sp. Sp. **Elb.** Seidewitztal b. Biensdorf an Schieferfelsen \pm 230 m sp. 1919 Ri.

122. *T. ruralis* (L.) Ehrh. [Ko. 125.] **D. g. G.** h. bis g. In der Ndr. und im Hgl. auch auf Ziegel- u. Strohdächern, oft in Massenvegetation u. reich fr. Noch auf dem Jeschken 1000 m Schi., Scho.!

123. *Schistidium apocarpum* (L.) Br. eur. [Ko. 128.] **D. g. G.** Bis ins obere **Erz.** Zechgrund b. Oberwiesenthal noch in 1020 m Höhe Scho.!
fo. *epilosa* Wtf. Mit der Stammform hie u. da.

124. *Sch. gracile* (Schleich) Limpr. Hgl., Bgl. z. **Vgt.** Im Krebeser Bache b. Gutenfürst-Burgstein. Feuchte Felsen b. Straßberg; in der Trieb b. Jocketa Sp. Elstertal u. Syrautal; Mühltröf an d. Bahn nach Langebach St.! Rautenkranz Granitfelsen, ebenso b. Morgenröte St.! **Erz.** Preßnitzer Spitzberg 910 m Scho.! Steinbach b. Jöhstadt 680 m