

über der Pillnitzer Insel 105 m. Ri. **Lzn.** Auf Teichschlamm im Jäger- u. Farnteich b. Moritzburg Schi.

179. Ph. acuminatum (Schleich) Br. eur. s. s. **Vgt.** In einem Rasen v. *Dieranella Schreberi* eingesprengt, auf dem lehmigen Ufer eines kleinen Baches zw. Steins und Rodersdorf 450 m Sp.

180. *Ph. pyriforme* (L.) Brid. [Ko. 239.] z. v. Ndr. u. Hgl. **Elst.** Leipzig h. Ko. **Vgt.** Ziegelei-Ausstiche Plauen-Glockenberg. Wiesen-graben oberh. Straßberg u. Weischlitz Sp. Grabenränder b. Klein-Friesen; am Waldrand a. Essigsteig, Gräben am Wege von Barthmühle n. Jocketa St. **Mld.** Mittweida, am Wegrand des Gemeindeteiches in Rößgen; Straßenböschung der Diebsstraße; Schutthaufen am Schwem-mteich St. **Erz.** Gröllenburg Wald Schi. Tharandt Wo. Spechtshausen 1893 Wo! **Elb.** Dresden: Botanischer Garten Wo. Zwischen Strehlen u. Mockritz 1884 Schi. Wachwitzgrund 1892 Wo.! Niederwartha Wo.! Weesenstein, Burkhardswalde, Gräben 180 m, Wilisch, Wiesengraben b. 320 m Ri. Meißen: Diesbar u. Seußlitz St. **S. S.** Wiesengräben am Winterberg 1897 Schi. **Lzn.** Saubbruch b. Lausa 1900 Schi. Uhna Trau. Zittau: Wiesen an der Weinau 1920 We.! Nedaschütz u. Göda Feu., Ri., Wi. Königswartha Scha.! **Lzb.** Sumpfwiesen b. Reichenau Gerst. Czorneboh, Waldgräben Ri., Wi.

181. *Entosthodon fascicularis* (Dicks.) C. M. [Ko. 240.] **Elst.** Um Gera n. s. S. u. M. **Mld.** Bei Wolkenburg Ha. **Erz.** Bei Chemnitz Lösche. **Elb.** Dresden: Großer Garten, Plauenscher Grund Hüb. Blasewitz Fic. u. Schubert. Auf Äckern z., b. Niedersedlitz, Dohna, Weesenstein, Burkhardswalde-Maxen, Schlottwitz, Glashütte Ri. Ferner b. Lock-witz, Lockwitzgrund, Kautzsch, Bärenklause, Kreischa, Sobrigau, Goldne Höhe, Possendorf Ri. Pirna u. Umgegend, Langenhennersdorf, Berggießhübel Ri. Überall auf Äckern v., aber stets in kleinen Räschen mit a. Moosen. **S. S.** Königstein-Pfaffendorf 270 m, Rathewalde-Zesch-nig ± 300 m Ri. **Lzn.** Uhna, auf Kleeäckern h. Trau. Bautzen: Feld b. Teichnitz Wi.!

401. Discelium nudum (Dicks.) Brid. s. s. **Vgt.** Neumark, Eisen-bahndamm Ko.! In großer Menge von Ko. 1926 entdeckt, und er hat damit der sächsischen Moosflora einen neuen wertvollen Bürger ge-wonnen, der auch anderwärts s. ist und unbeständig. Soll in Kopsch, Bryoth. Sax. exsicc. ausgegeben werden.

182. *Funaria hygrometrica* (L.) Sibth. [Ko. 47.] **D. g. G.** Auf Schuttplätzen, frischen Aufschüttungen, an Mauern, Brandstellen, in Lehmgruben, auf Äckern u. wüsten Plätzen, oft in riesiger Menge, von der Ndr. bis zu den höchsten Bergen. Am Fichtelberg bei 1180 m mit *Webera cruda* u. *Marchantia polymorpha* ♂ u. fr. gefunden 1921 Ri.

v. *patula* Br. eur. **Elb.** Seidewitztal, Kalkbruch b. Nennt-mannsdorf an feuchten Kalkfelsen St.!! Plauenscher Grund in alten Steinbrüchen an feuchten Felsen Ri.