

wiesen a. Weg n. d. Schäferrei 550 m st. Ri.; nw. Schlettau unweit d. Finkenburg im Sumpfgraben La.! Lauenstein—Liebenau, Geising—Zinnwald, Sumpfwiesen 550—750 m Ri. **Lzn.** Arnsdorf—Dretschen, Sumpfwiesen; Preske b. Bautzen, Torfwiese; Königswartha: Gr. Ziegelteich, 135 m; überall st. Ri. Moritzburg: Großteich 1899 Scho. (als *Kneiffii*).

367. D. intermedius (Lindb.) Wtf. (= *H. intermedium* Lindb.). [Ko. 76.] Nur im w. Gebiet h. **Elst.** Leipzig: auf Torfwiesen a. Bienitz 1907 Mö. 1913 Ko. **Vgt.** Auf Sumpfwiesen s. h. Sp., St. **Erz.** Gottesgab, Moore 1889 c. fr. Reiche s. sp.! Chemnitz: im Walde nach Oberlichtenau St. (Dagegen Reitzenhain 1893 Naumann = *H. aduncum Kneiffii*.) **Lzb.** Ob.-Putzkau: Teich bei der Buschmühle Scha. NB. Bei Böhm.-Leipa u. Hohlen Schffn.

v. *Cossoni* (Schpr.) Sanio (= *H. Cossoni* Schpr.). [Ko. 274.] **Elst.** Leipzig: Bendorf b. Delitzsch Mö.! **Vgt.** Sumpfwiesen b. Schöneck bei Raun Sp. Syrau u. Frotschau, Teichränder nach Bernsgrün St.!

368. D. revolvens (Sw.) Wtf. (= *H. revolvens* Sw.). s. **Vgt.** Moorige Wiesengräben bei Theuma 1905 St. Bei Pausa Sp. **Erz.** Zeisigwald b. Chemnitz Rbh. Abertham c. fr. 900 m i. Hochmoor mit Sumpfkiefer die Lachen ausfüllend 1902 Scho.! Schwarzenberg: in d. Nähe des Hennebergs auf feuchten Stellen 1804 X.! **Lzn.** Hoyerswerda u. Niesky Rbh.

369. D. uncinatus (Hedw.) Wtf. (= *H. uncinatum* Hedw.). [Ko. 77.] **D. g. G.** Hgl. v. Bgl. h. **Elst.** Gera. **Vgt.** s. h. St., Sp. **Mld.** v. **Erz.** h., bis auf die Gipfel steigend: Auersberg 1000 m, Haßberg 997 m, Fichtelberg 1200 m, Keilberg 1200 m, Gottesg. Spitzberg 1100 m, Geising 800 m. **Elb.** In allen Seitengründen des Elbtals z., aber c. fr. **S. S.** n. s. **Lzn.** Dresdner Heide hier u. da. Zittau: Neißetal We.! **Lzb.** s. v.

v. *plumosum* Schpr. u. v. *plumulosum* Br. eur. mit d. Normalform. **Lzb.** Lausche Ri., We.! NB. Kalkberg 700 m u. Jeschken 1000 m Scho.!

370. D. Sendtneri (Schpr.) Wtf. (= *H. Sendtneri* Schpr.). s. [Ko. 277.] **Elst.** Leipzig, in Ausstichen b. Gautzsch Mö. Am Bienitz Ko. Um Gera auf Sumpfwiesen L. u. F. (Dagegen ist Weinböhla (**Elb.**) ♂ Schi. = *H. adunc. Kneiff.*)

v. *Wilsoni* Schpr. (= *H. Wilsoni* Schpr.). s. [Ko. 78.] **Elst.** Leipzig: am Bienitz st. Ko. **Elb.** Meißen: Niederau, Nasse Aue 1918 Sie.!

371. D. lycopodioides (Brid.) Wtf. (= *H. lycopodioides* Brid.). s. s. **Elst.** Bei Tauna in tiefen Mooren Mö. **Vgt.** Auf einer Sumpfwiese zw. Pausa u. Bernsgrün Sp. **Mld.** Bei Lausigk, in Sümpfen. 1830 (Müller?!). **Elb.** Nasse Aue b. Meißen Hüb. Wittgensdorf Schubert, Klotz.

372. D. aduncus (Hedw.) Mönk. (= *H. aduncum* Hedw.). **D. g. G.** Die ungleich schwierigste und neben *cupressiforme* auch formenreichste Gruppe unserer Laubmoose! Während aber das Zellnetz bei jenem in allen Varietäten und Formen dasselbe bleibt, verändert es sich hier ganz bedeutend innerhalb einer bestimmten Variationsbreite. Daher die Schwierigkeit in dem Einteilungsmodus. Während bei Schimper, Rabenhorst u. a. nur eine Art in den Mittelpunkt gestellt wird, von dem das