390. *Calliergonella cuspidata* (L.) Loesk. (= *H. cuspidatum* (L.) Lindb. = *Acrocladium cusp.* (L.) Lindb.). [Ko. 84.] g. **D. g. G.** Zwar meist st., aber viel öfter c. fr. anzutreffen als *H. stramineum.*

v. *fluitans* Klinggr. **Elst.** Leipzig, untergetaucht in Ausstichen bei Gautzsch 1907 Mö.! **Vgt.** In Teichen oberhalb Zwoschwitz (Plauen) und bei Straßberg Sp. **Elb.** Pirna: Birkwitzer Tongruben im Wasser schwimmend + 115 m 1911 Ri. Niederseidewitz: verl. Kalkbruch 260 m 1922 Ri.

v. *mollis* Klinggr. **Vgt.** Triefende Felsen oberhalb Weischlitz Sp.

v. *reptans* Wtf. **Elb.** Wilischbachtal, auf einem Baumstumpf 1910 Scheidh.!

fo. *murorum* Riehmer. **Elb.** Pillnitz, Hohe Brücken: an einer Brücke am Mörtel 240 m 1921 Ri.

391. *Scorpidium scorpioides* (L.) Limpr. (= *Hypnum scorpioides* L.) z. s. [Ko. 286.] **Elst.** Gera s., im St. Gangloffer Wald S. u. M. **Vgt.** Auf Torfboden bei Schönberg und Mühltroff 1905 St., Sp. Pausa: Sumpfwiese nach Bernsgrün. Mühltroff, in einem Teiche. Torf einer Fichtenschonung. Torfgräben b. Unterkoskau St. **Erz.** Chemnitz: Zeisigwald Rbh. **Elb.** Frauenhain bei Raden, Moorsümpfe 1896 Scho.! **Lzn.** Dresdner Heide: Saubruch + 230 m 1886 Schi., 1916 ♂ u. c. fr. Ri. Saubrudel bei Lausa Gerst. Olterteich hinter dem Heller 1865 Ed.! (jetzt verschwunden). Königswartha: Pischzangteich, in Menge 135 m. Hoyerswerda, Torfmoore 1912 Ri. **Lzb.** NB. Schluckenau Karl, Mat.!

v. *julaceum* Sanio. **Lzn.** Dresdner Heide: Teich a. Bösen Loch 1886 Schi., 1895 Wo. 1906!! Darunter eine fo. *turgida* Riehmer, im tiefen Wasser untergetaucht mit gedunsenen Stengeln und Ästen und besonders dick aufgeschwollenen Enden. 1916 st. Ri.

392. *Hylocomium proliferum* (L.) Lindb. (= *Hylocomium splendens* (Dill. Hedw.) Br. eur.). [Ko. 180.] Bgl. h. Hgl. z. In der Ndr. noch in der Dölauer Heide bei Halle Bernau. **Elst.** h. **Vgt.** g. **Mld.** Penig: am Drachenfels, am Hühnerberge Vogel. Mittweida: Buchberg, Eichberg Z. Oschatz: Collmer Wald May. **Erz.** g. c. fr. Silbersgrün 1890 Bau.! Schwarzenberg Anf. Frühjahr fr. 1798 X.! **Elb.** Pillnitz, nach Schönfeld zu 1860 Bie.! Maxen, Kalkbrüche in Massenvegetation 1912. Winterleitenstraße, am Grunde feuchter Schieferfelsen mit *Rhodobry. ros.* u. *Mnium aff.*, *Climac. dendr.* c. fr. u. a. 200—280 m Ri. Seidewitztal, Nenntmannsdorfer Kalkbrüche 240—260 m, in reich ♂ blühenden Rasen Kalkbruch bei Biensdorf Ri. **S. S.** Uttewalder Grund 1862 Seidel! Adlers Loch 1916 Scha.! Hinterhermsdorf 1863 Bie.! **Lzn.** Dresdner Heide 1865 Ed.! Fischhausgrund 1876 —?! Löbauer Berg 430 m 1883 Wagner! **Lzb.** Picho, auf Waldboden Feu.! Neukirch, Ob.-Putzkau. Valtenberg Scha.

393. *Hylocomiastrum umbratum* (Ehrh.) Fleisch. (= *Hylocomium umbratum* (Ehrh.) Br. eur.). s. s. **Erz.** Keilberg Rbh.? Teufelsstein bei Steinbach, 1 Stunde von Johanngeorgenstadt 15. 11. 1801 st., aber c. fl. X.!

Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
SMWK
Naturwissenschaftliche Gesellschaft ISIS zu Dresden e.V.