

- G. aquatica* WAHLNBG. Gräben, Teiche, Sümpfe, große Bestände bildend; vertritt oft *Phragmites*.
- Nardus stricta* L. Moore und Heiden, häufig.
- Cyperus fuscus* L. Ufer, feuchte Stellen. Sch., H.: Großteich; Is. 1890: Westufer des Schloßteiches; H.: Buschmühlenteich.
- Eriophorum vaginatum* L. Torf- und Moorboden, zerstreut. H.: Am Fraunteich, bei Steinbach.
- E. polystachyum* L. Sumpfige Wiesen, Moorboden, im ganzen Gebiet häufig.
- E. latifolium* HOPPE. Torfige Wiesen, zerstreut, z. B.: H.: Wiesen neben der Moritzburger Kastanienallee.
- Heleocharis palustris* R. BR. Teichränder, Sümpfe, Gräben, sumpfige Wiesen. Häufig im ganzen Gebiet.
- H. palustris* ssp. *uniglumis* SCHULT. H.: Mittelteich; H., Sch.: Großteich.
- H. ovata* R. BR. Abgelassene Teiche, Ufer, zerstreut. Is. 1890: Westufer des Schloßteiches. H.: auf dem Grunde des abgelassenen Schloßteiches in großer Menge; Pfarrteich; Buschmühlenteich.
- H. acicularis* R. BR. Ufer, Gräben. Nach dem Ablassen fast in allen größeren Teichen in großen Beständen sichtbar.
- Scirpus setaceus* L. Feuchter Sandboden, Ufer, Gräben. Zerstreut. Sch.: Großteich; H.: Dippelsdorfer Teich; Moor bei Steinbach.
- S. lacustris* L. Am Ufer der meisten Teiche in großen Beständen.
- S. silvaticus* L. Feuchte Wiesen, Gräben und Ufer. Häufig.
- S. radicans* SCHKUHR. Ufer, sumpfige Wiesen; zerstreut.
- Rhynchospora alba* VAHL. Torfsümpfe, moorige Wiesen, zerstreut. H.: Funkenteich, große Flächen dicht bedeckend. Steinbacher Torfwiesen.
- R. fusca* R. u. SCH. Torfsümpfe, moorige Wiesen, zerstreut. H.: Steinbach, Köckritzteich.
- Carex pulicaris* L. Torfige Wiesen, zerstreut. H.: sumpfige Wiesen bei der Mistschänke; bei Steinbach.
- C. cyperoides* L. Abgelassene Teiche, Waldsümpfe, zerstreut. Alten-teiche, Georgenteich, Is. 1890: Westufer des Schloßteiches; H.: Niederer Waldteich, Köckritzteich.
- C. brizoides* L. Feuchte Waldstellen, verbreitet.
- C. vulpina* L. Feuchte Wiesen, Gräben, Sümpfe, verbreitet. H.: Fraunteich.
- C. muricata* L. ssp. *Leersii* SCHULTZ. Sumpfränder, häufig.
- C. stellulata* GOOD. Sumpfige Wiesen, verbreitet. H.: bei der Mistschänke.
- C. leporina* L. Moorige Wiesen, häufig.
- C. elongata* L. Sumpfige Waldstellen, Teichränder, Gräben; verbreitet. H.: Wassertümpel bei Steinbach; Schloßteich.
- C. canescens* L. Moorwiesen und Waldbrüche; häufig. H.: Schloßteich.
- C. remota* L. Feuchte Wälder; häufig.
- C. canescens* L. × *remota* L. Is. 1905, W., H.: bei Moritzburg.
- C. elata* ALL. (*C. stricta* GOOD.) Sümpfe, Teichränder; verbreitet. Tritt fast an allen Teichen in großen Beständen auf. H., M.: Ilshenteich, Großteich, Dippelsdorfer Teich, Moor am neuen Anbau.