

- C. caespitosa* L. Feuchte Wiesen; zerstreut. H.: Schloßteich.
- C. gracilis* CURT. (*C. acuta* L.). Sümpfe, Gräben, Ufer; häufig. H.: Großteich, Frauenteich.
- C. Goodenowii* GAY. (*C. vulgaris* FR.). Moorige Wiesen und Teichufer; überall häufig.
- C. Buxbaumii* WAHLNBG. Sumpfige Wiesen; selten. H.: beim Dippelsdorfer Teich.
- C. flacca* SCHREB. (*C. glauca* SCOP.). Feuchte Wiesen und Waldränder; zerstreut. H.: Sumpfige Wiesen im Friedewald.
- C. pilulifera* L. Häufig auf feuchten Wiesen.
- C. montana* L. Ufer, feuchte Wiesen; zerstreut. H.: Ufer des Schloßteiches.
- C. panicea* L. Feuchte Wiesen, gemein durchs ganze Gebiet. H.: Oberauer Großteich; ausgetrocknete Teichstellen bei Moritzburg.
- C. Pseudocyperus* L. Teichränder, Sümpfe; zerstreut. H.: Schloßteich.
- C. flava* L. Moorige Wiesen; häufig. H.: Moore am Neuen Anbau.
- C. flava* ssp. *Oederi* RETZ. Torfige Wiesen, feuchter Sandboden; zerstreut. H.: Moritzburg.
- C. riparia* CURT. Gräben, Sümpfe, Teichränder. H.: Dippelsdorfer Teich.
- C. rostrata* STOKES. Teichränder, Sümpfe, verbreitet im ganzen Gebiet. H.: Moor am Neuen Anbau.
- C. vesicaria* L. An Teichen, Sümpfen, Gräben; im ganzen Gebiet häufig.
- C. lasiocarpa* EHRH. Sümpfe, Torfmoore; häufig. H.: Köckritzteich; Moritzburg.
- C. elata* × *Goodenowii*. W.: bei Oberau; H.: Bauerteich.
- Acorus Calamus* L. Teiche, Sümpfe, Flüsse, Gräben; verbreitet. Niederer Waldteich, Schloßteich, Mittelteich, Frauenteich, Großteich.
- Lemna trisulca* L. Teiche, Sümpfe, Gräben; zerstreut. N.: Schloßteich.
- L. polyrrhiza* L. Sümpfe, Teiche; verbreitet. Mit der folgenden Art zusammen in den meisten Teichen des Gebietes.
- L. minor* L. Gräben, Teiche; häufig im ganzen Gebiet.
- Juncus conglomeratus* L. Gräben, feuchte Stellen; im ganzen Gebiet häufig.
- J. effusus* L. Gräben, feuchte Orte; häufig. H.: Sumpfwiesen hinter der Mistschänke.
- J. glaucus* EHRH. Feuchte Wegränder, Gräben; zerstreut.
- J. filiformis* L. Sumpfige Wiesen; zerstreut. Is. 1894: Oberauer Teiche; Sch.: Großteich. M.: Bauerteich; Steingrundteich.
- J. capitatus* WEIGEL. Auf feuchtem, sandigem Boden. Is. 1894: Oberauer Teiche; bei Steinbach. H.: Steinbach; Dippelsdorfer Teich.
- J. squarrosus* L. Torfige Wiesen, Sumpfränder; verbreitet.
- J. Tenageia* EHRH. Feuchte, sandige Orte, abgelassene Teiche; zerstreut. Is. 1894: bei Steinbach; Sch.: Großteich; H.: Steinbach; Mittelteich.
- J. supinus* MOENCH. Gräben, Sümpfe, Moore; nicht selten. H.: Moritzburg; Boxdorfer Teich.
- J. articulatus* L. (*J. lampocarpus* EHRH.). Nasse Wiesen, Sümpfe, Gräben. Im ganzen Gebiet, an den Teichen meist in großen Beständen.
- J. acutiflorus* EHRH. Sumpfige Waldstellen, Moore; verbreitet.