

- E. hexandra* DC. Teich- und Sumpfufer; selten. Is. 1890: Niederer Waldteich; H.: Schloßteich, Großteich, Oberauer Teiche, Köckritzteich; W.: bei Dippelsdorf.
- E. Alsinastrum* L. Teichränder, Sümpfe; selten. H.: bei Steinbach.
- Viola palustris* L. Sumpfige Wiesen, Torfmoore; verbreitet.
- Lythrum Salicaria* L. Feuchte Wiesen, Gräben, Ufer; häufig.
- Peplis Portula* L. Überschwemmt gewesene Stellen, Ufer, feuchte Äcker; nicht selten. Sch.: Großteich.
- Epilobium obscurum* ROTH. Gräben, Ufer, quellige Waldstellen; zerstreut. H.: kleiner Teich und Graben vor Volkersdorf; Graben zwischen Volkersdorf und Bärnsdorf.
- E. palustre* L. Torfige Wiesen, Gräben, Ufer; verbreitet.
- Trapa natans* L. Stehende und langsamfließende Gewässer; selten. Georgenteich, Steingrundteich, Fischerteich, Schloßteich, Mittelteich, Oberer Altenteich.
- Hippuris vulgaris* L. Stehende und langsamfließende Gewässer; selten. W.: bei Steinbach.
- Hydrocotyle vulgaris* L. Sumpf- und Moorboden, feuchte Waldstellen; verbreitet.
- Cicuta virosa* L. Sümpfe, Teichränder, Gräben; ziemlich zerstreut. N.: Schösserteich.
- Oenanthe fistulosa* L. Gräben, Sümpfe; zerstreut. H.: Schloßteich.
- Oe. aquatica* POIR. Gräben, Sümpfe; zerstreut an den meisten Teichen des Gebietes.
- Meum athamanticum* JACQ. Sehr zerstreut, nur Is. 1894: feuchte Wiesen bei Steinbach.
- Peucedanum palustre* MOENCH. Sumpfige Wiesen und Gebüsche; ziemlich zerstreut. H.: Bachufer bei der Buschmühle; sumpfige Wiesen beim Großteich.
- Vaccinium Oxycoccos* L. Torfboden; verbreitet. H.: Funkenteich.
- Erica Tetralix* L. Moorige Wald- und Heidestellen. In der Lausitzniederung verbreitet. Im Gebiet die südlichsten Standorte erreichend. W.: bei Dippelsdorf. Is. 1904, W., H., M.: Funkenteich; M.: hinter der Buschmühle.
- Hottonia palustris* L. Gräben, Sümpfe; zerstreut. Am Fraunteich und Jägerteich in größeren Beständen.
- Lysimachia thyrsoflora* L. (*Naumburgia thyrsofl.* MOENCH). In der Lausitzniederung verbreitet, sonst selten. Bauerteich, Schloßteich; H.: Mittelteich.
- L. vulgaris* L. Feuchte Gebüsche, Gräben, Ufer; häufig.
- L. paludosa* BAUMG., ssp. von *L. vulgaris*, Sch.: Großteich.
- L. Nummularia* L. Feuchte Wiesen, Gebüsche, Ufer; häufig.
- Trientalis europaea* L. Wälder und Moore; H.: im Friedewald auf Moorwiesen.
- Centunculus minimus* L. Auf feuchtem, sandigem Boden; zerstreut. H.: am Oberen Waldteich.
- Gentiana Pneumonanthe* L. Feuchte, torfige Wiesen; verbreitet. Im Gebiet vereinzelt am Oberauer Großteich; H.: Funkenteich; Tiergarten.