

- Menyanthes trifoliata* L. Sümpfe, Gräben, Teichränder; zerstreut.
N.: Schösserteich.
- Myosotis palustris* LAM. Gräben, feuchte Wiesen; gemein.
- M. caespitosa* SCHULTZ. Wiesen, Gräben; zerstreut. H.: Ilschenteich, Großteich.
- Scutellaria galericulata* L. Gräben, Sumpfränder, feuchte Waldstellen; verbreitet.
- S. minor* L. Sumpfige Wiesen, Moorboden; sehr zerstreut. W.: Dippelsdorf, Moritzburg, Steinbach; H.: Südufer des Mittelteiches; bei der Mistschänke; M., H.: Bauerteich.
- Stachys palustris* L. Feuchte Äcker, Gräben, Ufer; häufig, z. B. Schösserteich.
- Lycopus europaeus* L. Gräben, Ufer, feuchte Orte; häufig.
- Mentha aquatica* L. Ufer, Gräben, feuchte Gebüsche; häufig.
- Solanum Dulcamara* L. Ufer, feuchte Gebüsche; meist häufig. Am Schösserteich; Großteich bei Oberau.
- Scrophularia nodosa* L. Gräben, Gebüsche, feuchte Wälder; häufig; z. B. Graben im Gebiet des früheren Jungfernteiches.
- Limosella aquatica* L. Schlammige Ufer, ausgetrocknete Gräben; zerstreut. N.: Oberer Waldteich; H.: auf dem Grunde des Schloßteiches.
- Veronica scutellata* L. Gräben, Sumpf- und Teichränder; ziemlich verbreitet. N.: Graben beim Oberen Waldteich.
- V. Beccabunga* L. Gräben, Bäche, Quellen; häufig, z. B. Fischerteich.
- Euphrasia Rostkoviana* HAYNE (*E. pratensis* FR.) ssp. *montana* JORD.
H.: Nordrand des Fraunteiches.
- E. stricta* HOST. ssp. *suecica* MURB. u. WETTST. Feuchte Wiesen; selten.
W.: am Funkenteich.
- Pedicularis silvatica* L. Moorige Wiesen und Waldränder; häufig.
- P. palustris* L. Sumpfige Wiesen, Sumpf- und Teichränder; verbreitet, z. B. Fraunteich, Großteich.
- Utricularia vulgaris* L. Gräben, Sümpfe, Teiche; verbreitet. Sch., H.: Großteich.
- U. neglecta* LEHM. Sümpfe, Teiche; selten. W.: bei Moritzburg.
- Litorella uniflora* ASCHRS. (*L. lacustris* L.). Sandige und schlammige Teichufer; sehr zerstreut. Sch., H.: Großteich. H.: SO- und O-Ufer des Mittelteiches, oft in reinen Beständen den Teich umsäumend. Is. 1890: Niederer Waldteich. Is. 1905: Moritzburg; Dippelsdorf.
- Galium uliginosum* L. Feuchte Wiesen, Sumpfränder, Ufer; verbreitet.
- G. palustre* L. Feuchte Wiesen und Gebüsche; häufig.
- Valeriana dioeca* L. Sumpfige Wiesen; häufig, z. B. Fraunteich.
- Succisa pratensis* MOENCH. Wiesenmoore, Grasplätze; häufig, z. B. N., M.: Fraunteich.
- Gnaphalium uliginosum* L. Feuchte Äcker, Ufer, ausgetrocknete Gräben und Sümpfe; gemein.
- G. luteo-album* L. Sandiger, feuchter Boden, Teichränder; zerstreut.
H.: Großteich; Wiesen bei Steinbach.