

Säugethiere.

Fortpflanzung.	Nahrung.	Art der Zubereitung.
hiera.		
Das Weibchen wirft im Jan. od. Febr. 2 Junge.	Pflanzen, Wurzeln, Beeren, Fleisch.	Wie Wildschwein.
Das Weibchen wirft Ende Decemb. 2 Junge.	Fische und Seehunde.	"
Das Weibchen wirft im Januar 2—3 Junge.	Hasen, Mäuse, Maulwürfe, Schlangen.	"
	Im Nothfalle auch Vegetabilien.	
Das Weibchen wirft nach 9 Wochen 3—4 Junge.	Fische, Krebse zc., im Nothfalle Vegetabilien.	Siehe Vorschriften.
"	Hasen, Mäuse zc., junge Schafe und Ziegen zc.	Wie Hochwild zc.
Das Weibchen wirft nach 8 Wochen 6—8 J.	Hasen, Rehe, Vögel, Fische zc.	Wie Hasen.
Haushund, Canis familiaris L., scharf gewürzt, wie Hasen zubereitet gegessen.		
üßler.		
Das Weibchen wirft nach 9 Mon. 1, felt. 2 J.	Fische, besond. Flachsische, Krebse zc.	Wie Hammelfleisch.
"	" " " " "	"
"	" " " " "	"
"	Muscheln.	"
hiera.		
Das Weibchen wirft 3—5 Junge.	Vegetabilien.	Gepöfelte geräuch. wie Schweinesfl.
Das Weibchen wirft 4—5 Junge.	Obst, Eicheln, Kastanien, Bucheckern, Nüsse zc.	Gebraten m. braun. pikanter Sauce.
Das Weibchen wirft nach 6 Wochen 4—6 Junge.	Weiden-, Pappel-, Birkenrinden und dergl.	Gebrat. u. gedünst. m. pikanter Sauce.
Das Weibchen wirft 2—3 Mal im Jahre 6—9 Junge.	Kräuter, Cerealien, Leguminosen zc.	Gebrat. m. pikanter Sauce od. Ragout.
—3 Mal im Jahre nach 3 Wochen 1—4 Junge.	Vegetabilien.	"
Nach 30 Tagen 4 Mal im Jahre: im März —2, im Mai od. Juni 3—6, im Juli 3—6, im August oder September 1—2 Junge.	Vegetabilien, besonders Kohllarten.	Siehe Vorschriften.
"	"	"
Das Weibchen wirft bis 10 Mal im Jahre 3—9 Junge.	"	"
—	—	—
In Nothfällen als pikantes Ragout zubereitet gegessen.		
gäuter.		
Brunstzeit: December und Januar.	Eicheln, Kastanien, Bucheckern, Mais zc., im Nothfall auch Aas, Würmer zc.	Siehe Vorschriften.
Die Bache wirft nach 18 Wochen 4—6 Junge.		
2 Mal jährlich 7—14 Junge.	Wie das Wildschwein. Stallfutter bekannt.	"