

Fortsetzung der

Namen der Thiere.	Heimath.	Erreichbare Körperlänge.
Der gemeine Braunfisch. <i>Phocaena communis</i> C.	Im nördl. atlantischen Ocean.	2,0 m.
Der Grint. <i>Phocaena globiceps</i> C.	"	7,0 "
Der Schwertfisch. <i>Phocaena orca</i> C.	"	7,0 "
Der Pottfisch (großköpfiger Pottwal). <i>Physeter macrocephalus</i> L.	Im atlantischen Ocean und den Nordmeeren.	21,0 "
Der gemeine oder grönländische Walfisch. <i>Balaena mysticetus</i> L.	Im nördlichen Polarmeer.	21,0 m lang u. 12 m Umfang.
Der Schnabelwal. <i>Balaenoptera boops</i> L.	Im ganzen Polarmeer und dem nördlichen atlantischen Ocean.	30,0 m lang.

Anmerkung: J. N. Kolb führt in seiner Bromatologie noch auf:

In Europa: Das Stachelschwein und der Bugkopf.

In Asien: Moschusochsen, Dypossum, Bobel, Schuppenthiere, Tiger, Hyänen, Bielfraß, Nashorn, Elephanten, Kameele, Springmäuse, Fledermäuse, Füchse, Affen, Seebären, Seelöwen u. n. A.

Tabelle der

Die Gesetze der Schonung einzelner Gattungen sind hierbei

Name der Vögel.	Familie.	Erreichbare Größe in cm angegeben.
I. Ordnung:		
Die Bachholderdrossel (Krammetvogel). <i>Turdus pilaris</i> L.	Drossel.	27 cm.
Die Weindrossel (Rothdrossel). <i>Turdus iliacus</i> L.	"	23 "
Die Singdrossel. <i>Turdus torquatus</i> L.	"	31 "
Die graue Graßmücke. <i>Sylvia hortensis</i> Behst.	Sänger.	16 "
Die gemeine Graßmücke (Dorngraßmücke). <i>Sylvia cineria</i> Lath.	"	16 "
Die Mönch-Graßmücke (Blattmönch). <i>Sylvia atricapilla</i> Lath.	"	16 "
Der große Würger. <i>Lanius excubitor</i> L.	Würger.	30 "
Der rothköpfige Würger. <i>Lanius ruficeps</i> Br.	"	22 "
Die Kohlmeiße. <i>Parus major</i> L.	Meißen.	16 "
Der Gartenammer (Ortolan). <i>Emberiza hortulana</i> L.	Finken.	17 "
Die Feldlerche. <i>Alauda arvensis</i> L.	Lerchen.	19 "
Der gemeine Staar. <i>Sturnus vulgaris</i> L.	Staare.	21 "