

## Erste Abtheilung.

### Von den Säugethieren.

#### A Nagethiere (Glires).

I. **Sciurus.** Dentes primores II superiores cuneati, inferiores acuti; molares ad utrumque latus superiores V, inferiores IV. Claviculae perfectae. Cauda disticha. Mystaces longae.

*Novae Hollandiae.* *Sciurus* hypochondriis prolixis, volitans, supra ex fusco canescens, subtus albus; cauda villosissima, compressa.

*Norfolck Island flying squirrel.* Phillip.  
p. 151.

*The Hepoona Roo.* White p. 288.

Ich rechne dieses Thier mit Phillip und White hierher, ob gleich Andre a) es für ein fliegendes Beuteltier erkennen. Alle äußere Ansicht, Form des Schädels, der Füße u. s. w. müßte entweder trügen, oder die Abbildungen beyder Reisenden sind verzeichnet, wenn der Hepunaru nicht zu den Eichhörnchen gehört. b)

a) Götting. gel. Anz. 1791. S. 53.

b) Beim Weibchen des Eichhörnchens soll sich zwar auch nach Phillip ein Beutel finden S. 105, da er aber dessen in der Beschreibung des Hepunaru nicht gedenkt, auch gar nicht sagt, daß er von diesem rede, so scheint dieses nichts zu beweisen. Mr.