Es finden sich in der obern Kinnlade acht Vorders gabne, wovon die benden mittlern, die nach vorne steben, die langern find, und eine etwas schräge Richtung haben. Die andern sechs Vorderzähne find etwas zus gespitzt, und ihre Spitzen nach innen gekehrt. Etwas hinter ben lettern Vorderzähnen der obern Kinnlade, fichn, damit die Eckzahne der untern eintreten konnen, einige Eckzähne, die nach den Backzähnen zu länger und größer werben, fie scheinen fegelformige Spigen auf einer breiten Flache, und ftehn vollkommen einer bem andern gegen über. Un jeder Geite ftehn vier Backgabne, von benen die benden mittlern die langsten find, der hinterste ist der kurzeste, sie haben eine drenfache Wurzel, deren eine Seite stumpf, und die zwen andern spitz sind. Ihre Wurzel besteht aus zwen Flachen, der innern und außern, die durch fleine Fortsatze getrennt find, die innere fieht den Backgabnen der untern Rinn-Lade entgegen, wenn der Dund regelmäßig gefchloffen ift.

In der untern Kinnlade fiehn seche Vordergabne, wovon die erstern, schrag stebenden, langer, die anbern aber furger, und die letten die furgesten find. Dann folgt ein dicht an die Vorderzähne angeschloßner Ecksahn (holder), der indeß nicht so lang ift, als in der obern Kinnlade. Dann folgen dren andre Eckjahne, von benen der mittlere der größte ift, der hintere der fleinere, Diese (cuspidati) scheinen mehr auf der innern Seite, als auf ber Mitte ihrer Wurzel zu ftehn. Ferner finden fich an jeder Geite der Kinnlade, vier Backzahne,