

- Francs.
- 4) *Felis ogygia*, Kaup, cah. II., tab. II. fig. 3.
 4. Vordere Hälfte des rechten Unterkiefers mit dem Eck- und den 2 vorderen Backenzähnen. 2
 Nahe verwandt mit der *Felis issiodorensis*, Crois et Job.
- 5) *Felis antediluviana*, Kaup, cah. II., tab. II. fig. 5.
 5. Ein Kieferfragment mit dem Fragment des letzten und vorletzten Backenzahns; Kleiner als die vorhergehende 1
- 6) *Agnotherium antiquum*, Kaup, cah. II. tab. I. fig. 3 u. 4.
 6. Eckzahn der rechten Oberkieferhälfte 1
 7. Vorletzter Backenzahn des rechten Unterkiefers. 1
 Dieses Genus scheint sich den Hunden zu nähern.
- 7) *Machairodus cultridens*, Kaup, cah. II. tab. I. fig. 5. *Ursus cultridens*. Cuv. *Cultridens*, Crois et Job.
 8. Fragment des Eckzahns des linken Unterkiefers 1
 Scheint ein von den Bären sehr verschiedenes Genus; bis jetzt hat man noch keinen solchen Eckzahn in Kiefern befestigt gefunden.

Nager.

- 8) *Palaeomys castoroides*, Kaup, Isis 1832 tab. 26. fig. 1 — 4.
 9. Ein Unterkieferfragment mit dem ersten wohl- erhaltenen Backenzahn und den drei Alveolen der Hinteren 2