

- Francs.
10. Ein Schneidzahn $\frac{1}{2}$
- 9) *Chalicomys Jaegeri*, Kaup, Isis 1832, tab. 26
fig. 1 — 6.
11. Oberkieferfragment mit den zwei ersten
Backenzähnen 2
12. Unterkiefer mit allen Backenzähnen 4
- 10) *Chelodus typus*, Kaup, Isis 1832, tab 26 fig. 1.
13. Erster Backenzahn des rechten Oberkiefers 1

Wiederkäuer.

- 11) *Dorcatherium Naui*, Kaup, cah. IV. inéd.
14. Linker Unterkiefer mit den hintersten fünf
Backenzähnen und der Alveole des ersten
und zweiten 8
15. Oberkieferfragment mit den vier hinteren
Backenzähnen 7
- Dieses neue Genus unterscheidet sich nicht
allein durch die Zahl der Backenzähne,
sondern auch wesentlich dadurch von allen
lebenden Genera, dass der erste Backenzahn
über der Synchondrose gesessen hat, wo-
durch ein unbedeutendes Diastema ent-
standen ist.
- 12) *Cervus anocerus*, Kaup in Karstens Archiv,
Band VI. tab IV. fig. 4 et 5.
16. (8) Geweihstange, der des Muntjacks ähn-
lich 1