

- 13)** *Cervus trigonocerus*, Kaup in Karstens Archiv tab. IV. fig. **12** — **14**.
- 17.** (9) Geweihfragment, wahrscheinlich dem der amerikanischen Hirsche mit einfachem Geweihe ähnlich $\frac{1}{2}$
- 14)** *Cervus curtocerus*, Kaup in Karstens Archiv, tab. IV. fig. **1**, **2** et **3**.
- 18.** (10) Geweihfragment, dem von *Cervus canadensis* ähnlich, aus der obersten Diluvialablagerung von Eppelsheim $3\frac{1}{2}$
- 15)** *Cervus dicranocerus*, Kaup in Karstens Archiv tab. IV. fig. **6** — **11**.
- 19.** (11) Jüngerer Geweih $\frac{1}{2}$
- 20.** (12) Aelterer Geweih $\frac{1}{2}$
- 16)** *Cervus Bertholdi*.
- 21.** Unterkieferfragment mit den drei hinteren Backenzähnen **4**
- 22.** Erster des Unterkiefers **1**
- 23.** Letzter des Unterkiefers **1**

Pachydermen.

- 17)** *Dinotherium giganteum*, Kaup, Description des oss. foss. Cahier I. Hermann v. Meyer in den Leopoldiner Acten, XVI. **2**. pag. **487**. Tab. **34** u. **35**.
- 24.** (14 a.) Gaumenfragment eines jungen Thieres, pl. I. der oss. foss. Dieses Stück enthält sieben Backenzähne. Die zwei ersten sind Milchzähne, von welchen der erste