

- fehlt. Der dritte ist gewechselt und der vierte, vorletzte alter Thiere, steckt noch im Knochen zum Theil verhüllt 18
- Dieses Stück ist so instructiv, als käme es aus den Händen eines Anatomen.
- 25.** Keimzahn unter dem ersten Milchzahn herausgenommen, tab. II. fig. 5 2
- 26.** (14 *b*) Keimzahn unter dem zweiten Milchzahn herausgenommen, tab. III. fig. 4; hat nur zwei Hügel, indem der Milchzahn deren drei hat 2
- 27.** Erster Milchzahn des rechten Oberkiefers 2
- 28.** (14. *d. a.*) Erster bleibender Backenzahn des alten Thiers, tab. II. fig. 5. 2
- 29.** (14. *d. β.*) Derselbe ein wenig abgenutzt, tab. II. fig. 6. 2
- 30.** (14. *e. a.*) Zweiter bleibender Backenzahn, abgenutzt, tab. II. fig. 4. 2
- 31.** (14. *e. β.*) Derselbe ein wenig abgenutzt, tab. II. fig. 3. 2
- 32.** (14. *c.*) Fragment des Oberkiefers mit den drei letzten Backenzähnen, tab. II. fig. 1. 10
- 33.** (14. *h.*) Linker Unterkiefer mit den zwei hinteren Backenzähnen und dem abgebrochenen Proc. coron., tab. IV. 70
- 34.** Ganz vollständige linke Unterkieferhälfte eines jungen Thieres mit allen vollkommen erhaltenen Backenzähnen (der letzte